

Die Haferrispe nach Aufbau und Verteilung der Kornqualitäten (Korngewichte und Spelzengehalte).

Von der K. Technischen Hochschule zu München
zur Erlangung der Würde eines
Doktors der technischen Wissenschaften
genehmigte Dissertation.

Vorgelegt von

Karl Fernekeß.

Referent:
Prof. Dr. E. Kraus.

Korreferent:
Prof. Dr. A. Schneider.

Tag der mündlichen Prüfung: 5. August 1908.



München 1908.

Pörsenbacher'sche Buchdruckerei (Nöck & Giehl), Herzogspitalstrasse 19.

Die Haferrispe nach Aufbau und Verteilung der Kornqualitäten (Korngewichte und Spelzengehalte).

Von der K. Technischen Hochschule zu München
zur Erlangung der Würde eines
Doktors der technischen Wissenschaften
genehmigte Dissertation.

Vorgelegt von

Karl Fernekeß.



Referent:
Prof. Dr. E. Kraus.

Korreferent:
Prof. Dr. A. Schneider.

Tag der mündlichen Prüfung: 5. August 1908.



München 1908.

Pörsenbacher'sche Buchdruckerei (Klöck & Giehl), Herzogspitalstrasse 19.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41555409_0011

Meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Professor
Dr. C. Kraus, sei für die Anregung und Förderung
der Arbeit, Herrn Assistent Dr. K. Eberhart für
die gütigst erteilten Ratschläge ergebenster Dank
ausgesprochen.

Einleitung.

Die Beschreibungen der Haferrispe in der Literatur beschränken sich in der Hauptsache auf die Erscheinungsformen im allgemeinen, in denen sich die Rispen äußerlich darbieten, während genauere Darlegungen des morphologischen Aufbaues nicht gegeben sind. Aufklärungen hierüber sind aber erforderlich, um die Beziehungen verschiedener Rispentypen zur Körnererzeugung tiefer erfassen zu können, einerseits hinsichtlich der von den Verzweignungsverhältnissen abhängigen Reichlichkeit des Ährchenansatzes, anderseits hinsichtlich der Verteilung der Kornqualitäten nach Korngewichten und Spelzengehalten und namentlich der hierin bestehenden größeren oder geringeren Gleichmäßigkeit.

Über die Verteilung der Körner nach Schwere und Spelzengehalt über die Rispe liegen schon mehrfache Untersuchungen vor. Deren Ergebnisse stimmen aber nicht ganz überein, ferner geben sie keinen hinreichenden Aufschluß darüber, inwieweit hiebei Unterschiede nach den Rispentypen verschiedener Sorten und Zuchten bestehen.

Die vorliegenden Untersuchungen erstrecken sich auf die Klärlegung des morphologischen Aufbaues der Haferrispe und auf die Verteilung der Kornqualitäten (Korngewichte und Spelzengehalte) und ihre Beziehungen zu den Verzweignungsverhältnissen. Die Erweiterung der Kenntnisse in beiden Richtungen wird nicht nur für die eingehendere Sortenkenntnis von Interesse sein, sondern auch für die Haferzüchtung als genauerer Anhalt zur Beurteilung des Produktionswertes unterschiedlicher Rispentypen.

Für die vorliegende Arbeit fand sich nur wenig einschlägige Literatur. Die speziellen Literaturnachweise sind dem folgenden Texte an den entsprechenden Stellen eingefügt. Hier folgt das Verzeichnis der benützten Veröffentlichungen.

G i c h l e r: Blütendiagramme, 1875.

F r u m w i r t h: Über den Sitz des schwersten Kornes in den Fruchtständen bei Getreide und in den Früchten der Hülsenfrüchte, Forschungen auf dem Gebiete der Agrikulturphysik, Bd. 15.

F r u m w i r t h: Die Haferrippe bei der Beurteilung der Sorten und in der Züchtung, Frühlings landwirtschaftliche Zeitung 1907.

F r u m w i r t h: Die Züchtung der landwirtschaftlichen Kulturpflanzen, Bd. 4.

S a d e l: Gramineae, in: Die natürlichen Pflanzenfamilien nebst ihren Gattungen und wichtigen Arten, insbesondere der Nutzpflanzen, bearbeitet von Engler und Prantl.

K r a r u p: Untersuchungen über die Erbllichkeit und Variabilität beim Hafer, Journal für Landwirtschaft 1905, Seite 94 und Wiedermanns Zentralblatt für Agrikulturchemie, 33. Jahrgang, Seite 96.

J. K a u m: Zur Kenntnis der morphologischen Veränderungen der Getreidekörner unter dem Einflusse klimatischer Verhältnisse, Münchener Dissertation, 1906.

W. K i m p a u: Das Blühen des Getreides, Landwirtschaftliche Jahrbücher 1883, Seite 875.

v o n K ü m l e r: Über die Verteilung des Korngewichtes an den Fruchtständen einiger Getreidesorten, Journal für Landwirtschaft 1890.

S t u t z e r und G i s e v i u s: Die Saatzuchtanstalt in Svalöf, in: Der Wettbewerb der schwedischen und dänischen Landwirte mit Deutschland 1904.

M l a n d e r: Die schwedische Pflanzenzüchtung zu Svalöf, Journal für Landwirtschaft 1906.

H. W y d l e r: Ein Beitrag zur Kenntnis der Grasinfloreszenz.

Die Arbeit wurde im landwirtschaftlichen Laboratorium und Versuchsfeld der K. Technischen Hochschule in München ausgeführt und zwar mit Anbau- und Zuchtmaterial, welches von der K. Saatzuchtanstalt in Weihenstephan stammte. Dem Oberleiter dieser Anstalt, Herrn Professor Dr. C. Kraus, sei für gütige Überlassung nochmals bester Dank ausgesprochen.

Es wurden folgende Hafer Sorten und Zuchten (Erntejahr 1906) in Untersuchung genommen:

Original Befeler Nr. II,

- " Strubes,
- " Svalöfs Goldregen,
- " Hvitling,
- " Borstlösa,
- " Vigowo,
- " Pfiffelbacher,
- " Duppauer,
- " Leutewitz,
- " Stuhlfaser (Walddler Hafer), im Bayerischen Wald
einheimisch.

Zuchtstamm Niederbairischer N H 3,

" Freisinger F H 5,

" Sechsamter S H 2.

Der morphologische Aufbau der Rispen wurde hauptsächlich an frischem, bald nach der Blüte geerntetem Material studiert, da an diesem manche Einzelheiten besser hervortreten als an der reifen Rispe.

Von jeder Sorte beziehungsweise jedem Zuchtstamm wurden sechs typische Rispen ausgewählt, soweit möglich je von einer dreihalmigen, zweihalmigen und einhalmigen Pflanze.

Die Verzweigungsverhältnisse jeder einzelnen Rispe wurden in Diagrammen (Grundriß) dargestellt. Auf eine Ebene, die senkrecht zur Hauptspindel gelegt gedacht ist, wurden sämtliche Ansatzstellen der einzelnen Äste projiziert. Daraus war die Stellung der Zweige nach ihrer gegenseitigen Lage in schematischer Darstellung ersichtlich (siehe Tafel 3 und 4); außerdem wurden alle Rispen im Aufriß in natürlicher Größe gezeichnet und zwar zunächst die Zweige der einzelnen Rispenstufen außer Zusammenhang, dann in unmittelbarer Kennzeichnung des Verzweigungszusammenhanges.

Weiter wurde von reifen Rispen abermals eine Auswahl in obiger Art getroffen. Von diesen Rispen wurde ein Aufriß aufgezeichnet und wurden die Längen der Internodien und die der einzelnen Verzweigungen eingetragen. Die Ährchen wurden nach einer bestimmten Reihenfolge mit fortlaufenden Zahlen bezeichnet, so daß an Hand dieser die Stellung jeden Ährchens an der Rispe erkannt werden konnte. Die einzelnen Körner der

Ahrchen (Außen-, Mittel- und Innenkörner) wurden zunächst mit Spelzen genau gewogen, darauf die Körner entspelzt und die nackten Körner abermals gewogen. Aus der Differenz beider Wägungen ergab sich der Spelzengehalt der einzelnen Körner.

Da die einzelnen Körner eines Ahrchens verschieden schwer sind und verschiedenen Spelzengehalt haben, so mußten sich die Gewichtsbestimmungen durchwegs auf die einzelnen Körner jedes Ahrchens erstrecken.

I. Der morphologische Aufbau der Haferrispe.

Die ältere Kennzeichnung der Unterschiede im morphologischen Aufbau der Haferrispe begnügte sich damit, als Rispenform die gewöhnliche Rispen- und die Fahnenform auseinander zu halten, wonach als Arten *Avena sativa* und *Avena orientalis* unterschieden wurden. Die genauere Beschäftigung mit der Sache und zuletzt ganz besonders die Haferzüchtung, welche eine Reihe abweichender Rispentypen zu berücksichtigen hat, ergab jedoch, daß mit den genannten zwei Formen diese mannigfachen Typen nicht zu fassen waren. Zu ihrer Klassifizierung hat die Saatzuchtsanstalt Svalöf folgendes System aufgestellt:

1. **Steifrispe**: Seitenäste steif, aufsteigend, erst gegen die Spitze zu gebogen, einzelne von ihnen die zur Seite gebogene Hauptachse an Stärke fast übertreffend, Umriß der Rispe einseitig pyramidenförmig.

2. **Buschrispe** (Spreizrispe): Seitenäste schwach aufsteigend, zart, Hauptachse gerade, Umriß der Rispe allseitig pyramidenförmig.

3. **Sperrispe**: Seitenäste steif, bogenförmig, Hauptachse unregelmäßig gebogen, Umrisse der Rispe eiförmig.

4. **Hängerrispe** (Schlaffrispe): Seitenäste kurz, schwach, horizontal abstehend oder bogig, Hauptachse stark hervortretend, aufrecht, Umriß der Rispe regelmäßig pyramidenförmig.

Fruwirth erwähnt noch einen weiteren Punkt zur Unterscheidung der Rispenhafer nach der Stellung der Äste zur Spindel. Er fand bei Hafer mit allseitswendender Rispe Individuen, die eine mehr einseitswendende Form zeigten und weist zugleich auf

Wilmorin hin, der solche Formen nach einigen Jahren in einen ausgesprochenen Fahrenhafer übergeführt habe. Ich vermochte ebenfalls bei den verschiedenen Sorten solche mehr einseitigwendende Formen zu erkennen. Besonders zeigen diese Einseitigwendigkeit die oben aufgeführten Zuchtstämme S H 2 und N H 3 und die Sorten Hvitling- und Pfiffelbacher Hafer.

Eine vervollständigte Klassifikation der Rispenformen wird diese Vorkommnisse zu berücksichtigen haben. Die zuverlässige Einreihung vorkommender Rispen Typen in das Svalöfer System bietet vielfach Schwierigkeiten, da es nicht an Übergängen fehlt. Solche fanden sich in dem von mir verarbeiteten Material selbst zwischen der typischen Steifrispe und der typischen Schlaffrispe.

Die Rispe von Beseler II und Strubes Hafer zählen entschieden zu den Steifrispen, Strubes Hafer mehr noch als Beseler Hafer. Beide besitzen kräftige Äste. Die Hauptäste (Äste I. Ordnung) der Quirle*) haben fast die Stärke der Hauptspindel; die Äste stehen an der Spindel in gedrängter Anordnung; der obere Teil der Rispenspindel, sowie der der Äste ist etwas geneigt, die Zahl der Äste im Quirl nicht sehr groß; dafür zeigen aber die starken Äste eine reichliche Verzweigung. Die Rispen erhalten dadurch eine schöne, volle Form.

Diesen beiden Hafern schließen sich nach der Steifheit der Äste Pfiffelbacher und Hvitlinghafer an. Auch diese Sorten können noch zu den typischen Steifrispen gezählt werden. Die Äste ihrer Rispen sind im allgemeinen etwas schwächer als die von Beseler und Strubes Hafer, auch sind sie nicht so reich verzweigt.

Hieran reihen sich noch einige Zuchtsorten von Svalöf und zwar in der Folge Svalöfs Goldregen, Borstlösa und Vigowo. Goldregenhafer kann schon als Übergang zur Sperrrispe betrachtet werden, doch steht er der Steifrispe noch ziemlich nahe. Die Äste von Goldregenhafer sind kräftig und haben eine sehr reiche Verzweigung. Diesen folgt Borstlösa, dessen Typus schon als Sperrrispe angesprochen werden kann. Die langen Äste stehen ziemlich von der Spindel ab, ihre Verzweigung kann nicht als reich bezeichnet werden. Die ganze Form hat ein lückenhaftes Aussehen.

*) In Wirklichkeit Scheinquirle; obige Bezeichnung wird der Kürze halber beibehalten.

Ligowohafer weist einen zusammengesetzten Typus auf; die Hauptäste stehen sperrig nach außen, während die höheren Verzweigungsordnungen der Äste schlaff herabhängen. In den unteren Quirlen nimmt die Zahl der Äste gegenüber denen der besprochenen Sorten zu.

Leutewitzer Gelbhafer bildet ebenfalls einen Übergang zur Schlaffrispe; er steht dieser ziemlich nahe. Die Spindel neigt sich sehr bald nach einer Seite.

Duppauer Hafer war von Svalöf als typische Schlaffrispe angeführt; doch könnte er nach meinem Material eher als Buschrispe angesprochen werden, weil seine Äste ziemlich gerade nach außen stehen, oder etwas geneigt sind.

Die Rispen der Hafer N H 3, S H 2, dann vom Stutz- oder Walbler Hafer, ähneln sich im Typus. Der Charakter der Schlaffheit tritt infolge des Vorhandenseins vieler, langer, dünner, noch dazu wenig verzweigter Äste in erhöhtem Maße hervor.

Endlich folgt noch der Zuchtstamm F H 5, dessen Äste etwas buschig erscheinen, aber auch herabhängen. Dieser Hafer hat die stärkste Basalverzweigung im Quirl.

Das Svalöfer System geht in der Hauptsache aus von der verschiedenen Steifheit und Richtung der Rispenverzweigungen. Die genauere Betrachtung wird aber auch den genaueren, morphologischen Aufbau zu beachten haben, da, wie weiterhin dargelegt, gerade von den, durch die Art des morphologischen Aufbaues gegebenen Unterschieden im Werte der einzelnen Ährchentragenden Verzweigungen die Unterschiede im Korngewicht und Spelzengehalt beeinflusst werden. Von der Verzweigungsordnung hängt ja auch die zeitliche Entwicklung der einzelnen Ährchen und damit die Aufblühfolge zusammen, was, wie für die ährenförmigen Fruchtstände nachgewiesen, das Verhältnis der Kornausbildung wesentlich beeinflusst.

Das gleiche wird auch für die Haferrispe zutreffen. W. Rimpau, der sich zuerst eingehend mit den Blühverhältnissen der Getreide beschäftigt hat, berichtet*), daß die Bestäubung der Blüten der Haferrispe in der Reihenfolge eintritt, wie die Blüten

*) W. Rimpau, das Blühen des Getreides, Landwirtschaftliche Jahrbücher 1883, Seite 875.

die Blattstheide verlassen, also von oben nach unten, nur daß die oberen Blüten jedes Ährchens etwas später stäuben als die unteren. In gleicher Folge verläuft aber auch die Reifung an der Rispe.

Drückt man die Äste an die Spindel an, so lassen sich an einer im entsprechenden Reifezustande befindlichen Rispe ganz allgemein drei Zonen unterscheiden. Der oberste Teil der Rispe hat sich schon ziemlich verfärbt, während der untere Teil, der sich größtenteils aus den Ästen des ersten und denen der höheren Ordnungen des zweiten Quirls zusammensetzt, noch vollständig grün erscheint. Die mittlere Zone bildet den Übergang.

Eine eingehende Darstellung des morphologischen Aufbaues der Grasrispe hat Wydler*) gegeben. Auf diese ist weiter unten zurückzukommen.

Der morphologische Aufbau der Haferrispe stellt sich folgendermaßen:

Die Haferrispe ist ein aus verschiedenen Verzweigungstypen zusammengesetzter Blütenstand. Die Grundverzweigung der Hauptspindel und ihrer Äste ist racemös, die Verzweigungen höherer Ordnungen sind zymös. Die Reichlichkeit der Verzweigungen nimmt an der Rispe von oben nach unten zu, indem die in dieser Richtung aufeinanderfolgenden Hauptäste sowohl eine zunehmende Anzahl von Zweigen gleicher Ordnung erzeugen, als auch aus diesen eine größere Zahl von Verzweigungsordnungen entsteht, und das gleiche wiederholt sich an jedem Hauptast.

1. Die racemöse Verzweigung.

Die Hauptspindel schließt mit einem Ährchen; die Äste I. Ordnung stehen an der Hauptspindel, durch Internodien verschiedener Länge von einander getrennt, in verschiedener Anzahl alternierend, zweireihig, öfter einseitig verschoben. Die Stellung entspricht der Blattstellung, im besonderen ergibt sich die Orientierung nach rechts und links aus der Richtung, in der die Scheide des obersten Laubblattes gerollt ist. Die Scheide hat eine deckende und eine bedeckte Hälfte (vergl. Wydler l. c.). Zwei aufeinanderfolgende Blattstheiden sind immer entgegengesetzt gerollt; die

*) G. Wydler, Ein Beitrag zur Kenntnis der Grasinflorenz.

Blätter einer Zeile haben sonach gleichsinnige Kollung. In Fortsetzung dieses gesetzmäßigen Wechsels in der Drehungsrichtung auf die Hauptachse der Infloreszenz, wo ja die Ausbildung der Stützeblätter ganz reduziert ist, sind die Stellungen zunächst der Äste I. Ordnung nach rechts und links analog bestimmt (und ebenso die der Zweige II. und folgender Ordnungen).

Der dem Gipfelährchen benachbarte Zweig I. Ordnung (oberste Rispenstufe, siehe Tafel 1, Stufe A) ist kurz und endigt ohne weitere sonstige Verzweigung mit einem Ährchen. Bei dem nächst tieferen, kräftigeren Zweige I. Ordnung (Stufe B) beginnt schon die Zweigbildung, indem aus ihm dicht an seiner Ansatzstelle ein (schwächerer) Zweig II. Ordnung entsteht. Beide Zweige schließen ohne weitere Verzweigung mit einem Ährchen. In der Stufe C erzeugt der Zweig I. Ordnung an seiner Basis ebenfalls einen Zweig II. Ordnung, dieser einen solchen III. Ordnung. Während diese Zweige (II. und III. Ordnung) sich nicht weiterverzweigen, bildet der Zweig I. Ordnung in einem größeren Abstand von der Basis wieder einen Zweig (II. Ordnung) mit einem Ährchen an der Spitze. In den unteren Stufen steigert sich diese Verzweigung. Bei den weitestgehenden Verzweigungen hat der Zweig I. Ordnung an der Basis zwei Zweige II. Ordnung dicht übereinander, weiter aufwärts weitere Zweige gleicher Ordnung in verschiedener Zahl, an denen sich, der Abnahme ihrer Stärke von unten nach oben entsprechend, die gleiche Verzweigungsweise wiederholt wie an der Hauptspindel selbst.

2. Die z h m ö s e Verzweigung.

Die z h m ö s e Verzweigung geht aus einer zu höheren Ordnungen fortschreitenden Reichlichkeit der Zweigbildung nach den nämlichen Stellungsgesetzen hervor, nach denen die Zweige razemös entspringen. Sie findet sich einmal an der Basis der Äste II. Ordnung, die an der Basis der Hauptäste stehen, dann analog an der Basis höherstehender, stärkerer Zweige der Äste I. und II. Ordnung.

Wie oben bemerkt, stehen an den starken Ästen I. Ordnung die Basalzweige II. Ordnung alternierend rechts und links von ihrer Mutterachse, der untere davon rechts oder links, je nach der Orientierung der Mutterachse selbst, an der Hauptspindel.

An der Basis schwächerer Äste I. Ordnung (und in den oberen Stufen der stärkeren Äste II. Ordnung) wird nur ein solcher Basalzweig erzeugt. Diesen Fall zunächst angenommen, so setzt sich die Verzweigung einseitig fort, jeder Zweig bildet nur einen Zweig. Diese aufeinanderfolgend einseitig auseinander entspringenden Zweige sind abwechselnd rechts und links zur jeweiligen Abstammungsachse orientiert. Das heißt, betrachten wir das Verzweigungssystem in der Richtung von Zweig I. Ordnung zu seiner Abstammungsachse (Hauptspindel), so daß also Auge, Zweig I. Ordnung und Hauptspindel in eine Ebene zu liegen kommen, so entspringt aus dem Zweig I. Ordnung ganz nahe seiner Ansatzstelle — angenommen nach links — der Zweig II. Ordnung. Werden der Zweig II. Ordnung und seine Abstammungsachse (Zweig I. Ordnung) in analoger Orientierung betrachtet, so geht der Ast III. Ordnung nach rechts ab und so fort. Diese Verzweigungsweise (Wickelbildung) ist im Grundriß in Figur A Tafel 2 schematisch dargestellt.

Eichler unterscheidet einfache und Doppelwickel (Figur A und B) und verschobene Doppelwickel (Figur D), wenn das seitliche Vorblatt nicht genau quer zur Abstammungsachse steht, sondern mehr oder weniger gegen die Mediane hingerrückt ist.

Der Wickel der Haferrispe ist mehr oder weniger verschoben (Figur D). Des leichteren Verständnisses halber nehmen wir jedoch in den Erklärungen und Darstellungen die rechtwinklige Anordnung an.

Die einfache Wickelbildung (Figur A) findet man hauptsächlich an den Zweigen der oberen Äste I. Ordnung. Die unteren tragen eine reichlichere basale Verzweigung, indem die starken Äste I. Ordnung an der Basis zwei starke, dicht übereinander entspringende Sprosse II. Ordnung erzeugen (siehe oben). Diese beiden Basalsprosse verzweigen sich an ihrer Basis, ganz wie oben angegeben, zymös weiter. Dadurch entstehen Doppelwickel (Figur B).

Wenn aber einer dieser Basalsprosse II. Ordnung — zumeist wohl der untere, kräftigere — selbst wieder zwei stärkere, dicht übereinander und ebenfalls entgegengesetzt angeordnete Basalzweige III. Ordnung erzeugt, wie bisweilen in der untersten Rispenstufe, so werden dann beide zum Ausgang je eines einfachen Wickels. In diesem Falle befinden sich also drei Wickel dicht an der Basis der ersten Stufe der Hauptspindel (dreifacher

Wickel) (Figur C). Der tiefer entspringende Ast III (Figur C) des Wickels rechts unten entspricht dem Aste III des Wickels links. Was die Verzweigung an der Basis höherstehender Zweige der Äste I. und II. Ordnung anbelangt, so wiederholt sich im Prinzip dasselbe wie bei den Basalzweigen. Dabei zeigt sich der Verzweigungsgrad von der Stärke der Äste abhängig. Stärkere Äste haben in ihren Stufen eine größere Anzahl von Verzweigungsordnungen als schwächere. Es sind also die unteren stärkeren Zweige, an deren Basis die reichzählige Wickelbildung stattfindet. Die Kräftigung kann bei den untersten auch so weit gehen, daß sie ebenso, wenn auch in schwächerem Maße, wieder Zweige, ebenfalls mit Wickelbildung, produzieren.

Wydler erklärt den Aufbau der Grasrispe an Hand einer schematischen Aufzeichnung der Rispe von *Poa annua*. Die Verzweigung geht hier höchstens bis zur IV. Ordnung. Dagegen gibt Figur 3 seiner Tafel II der Rispe von *Poa trivialis* ein Bild höherer Verzweigungsordnung.

Die Haferrispe ist, wie oben beschrieben, nach den gleichen Gesetzmäßigkeiten aufgebaut, wie Wydler für die Grasrispe überhaupt darlegt. Jedoch weist die Haferrispe in ihren basilären Auszweigungen viel höhere Ordnungen auf als die Grasrispe nach Wydler; dagegen produzieren die sonstigen Grasrispen in ihren einzelnen Ästen mehr Stufen und damit mehr Zweige gleicher (nächst höherer) Ordnung. Die Verzweigungsart der Grasrispe, wie sie Wydler aufzeichnete, würde also jener einer Haferrispe entsprechen, die eine verhältnismäßig geringe Anzahl von basilären Auszweigungen besitzt, dafür aber im oberen Astteil mehr verzweigt ist, so, wie dies bei der Streifrispe zutrifft. (Siehe unten.)

Die Figuren Tafel 3 und 4 zeigen den Aufbau zweier extremer Formen. Die eine, A, zeigt eine reichlichere basiläre Verzweigung, die andere, B, eine reichere Verzweigung im oberen Astteil. Die verschiedenen Ordnungsgrade sind in beiden Figuren mit römischen Zahlen gekennzeichnet.

Innerhalb eines einfachen Wickels sind die Ordnungsgrade der einzelnen Äste mit fortlaufenden Zahlen schlechthin bezeichnet; ebenso innerhalb eines Doppelwickels der Ast I. Ordnung, dann der untere stärkere Abstammungsast II. Ordnung und seine weiteren Verzweigungen. Der andere, also höhere, basale Zweig des Astes I. Ordnung und dessen weitere Verzweigungen tragen den Index ' (1 Strich). Wenn an der Basis des unteren, stärkeren Basalastes II. Ordnung wieder zwei Wickel vorhanden sind, so tragen die Zahlen für den höher angelegten Ast III. Ordnung dieses Doppelwickels und seine weiteren Sprosse den Index " (2 Striche).

Das oben geschilderte Prinzip des Aufbaues der Hafer-
rispe kann im einzelnen je nach Sorten- und Zuchtstamantypus in
recht verschiedener Weise verwirklicht sein. Es finden sich alle
Übergänge von der Form, wie sie die Figur Tafel 3 aufweist,
bis zur Verzweigungsform Figur Tafel 4; also von der mit
reicher Basalverzweigung zu der mit starker Verzweigung inner-
halb der einzelnen Äste.

Die Richtung der Äste zur Hauptspindel (mehr oder weniger
aufrecht oder hängend) und die eben erwähnte Verzweigungsart
stehen mehr oder weniger in Zusammenhang. Reiche Basalver-
zweigung zeigen insbesondere die Zuchtstämme S H 2, N H 3,
F H 5 und der Stutzhafer, also die schlaffrispigen Formen. Die
ausgesprochene Steifrispe hingegen verzweigt sich besonders stark
in den oberen Ästteilen bei geringerer Basalverzweigung.

Innerhalb einer Rispe kann die basale Verzweigung zu-
nehmen, indem auch an Zweigen aus höheren Rispenknoten, jedoch
selten über den vierten Rispenknoten hinaus, Doppelwickel auf-
treten, und indem in der Höhe des ersten, mitunter auch noch des
zweiten Rispenknotens je drei Wickel angelegt sind.

In Bezug auf den Rispentypus kann man im allgemeinen
sagen, daß die Steifrispe und die nächsten Übergänge zur Schlaff-
rispe in den zwei untersten, sehr selten noch in der dritten Stufe
basale Doppelwickel haben, während in den oberen Quirlen aus-
schließlich einfache Wickel vorhanden sind. Es kommt dagegen
sehr oft vor, daß schon die Äste des zweiten Quirls, ja hie und
da sogar die des ersten — dies konnte zum Beispiel bei Spittling-
hafer besonders bemerkt werden — an der Basis nur einfache
Wickel zeigen. Ganz im Gegensatz zu diesem Aufbau steht der
des Typus von Stutzhafer, S H 2, N H 3 und F H 5. Bei
diesen Sorten hat fast immer der unterste Quirl, vereinzelt auch
der zweite, drei basale Wickel angelegt. Der zweite Quirl ent-
wickelt noch einen Doppelwickel — einzelne Wickel kommen nie vor
— ebenso größtenteils der dritte Quirl. Von der vierten Stufe
aufwärts sind nur mehr mit vereinzelt Ausnahmen einfache
basale Wickel vorhanden.

Wie aus den späteren Erörterungen hervorgeht, ist die Art
der Verzweigung der einzelnen Typen von großem Belang für
die Beurteilung ihres Produktionswertes. Es wird deshalb an-
gezeigt sein, die oben erwähnten extremen Typen und ihre Über-
gänge etwas näher zu betrachten.

Die Steifrispen sind ausgezeichnet durch ihre starken Äste; sie haben eine verhältnismäßig günstige Verzweigung, indem diese starken Äste ziemlich viel Stufen erzeugen, während ihre basale Verzweigung nicht sehr hoch geht. Sehr gut ist im ganzen die Verzweigungsart der Rispe des Beseler Hafer. Am untersuchten Material hätten jedoch die Hauptäste mehr Stufen produzieren sollen, besonders erschien der zweite Quirl etwas leer in seinen Hauptästen, ferner gingen die basalen Auszweigungen im allgemeinen etwas zu hoch.

Die starken Äste von Strubes Hafer besitzen im allgemeinen verhältnismäßig viele Stufen. Ein Mangel in der Verzweigungsart besteht aber darin, daß die Verzweigung in diesen Stufen größtenteils zu hoch geht.

Die Äste des Pfiffelbacher Hafer sind im allgemeinen etwas schwach (wenigstens war dies bei den untersuchten Rispen der Fall) und hätten besonders in den beiden untersten Quirlen etwas stärker sein sollen, ebenso die Stufenzahl der Hauptäste etwas größer; besonders aber hatten die Rispen den Nachteil im Aufbau, daß innerhalb eines Astes die Zahl der Verzweigungen von oben nach unten plötzlich größer wurde, entsprechend der Verzweigungsart des Astes (Figur A, Seite 19).

Von den untersuchten Svalöfer Sorten stand bei Svittlinghafer die Verzweigung des oberen Rispentails der des unteren ziemlich nach. Von dieser Sorte wurde oben schon erwähnt, daß selbst der unterste Quirl in einfacher Wickelform aufgebaut ist. Auch bei Doppelwickeln kommt diese Ungleichmäßigkeit zum Ausdruck und zwar dadurch, daß der untere, stärkere Ast im Doppelwickel und seine weiteren Auszweigungen im Gegensatz zur zweiten Hälfte des Doppelwickels viel stärker verzweigt sind. Außerdem gingen die Verzweigungen der untersten Stufe der Hauptäste gewöhnlich sehr hoch.

Svalöfs Goldregenhafer machte schon auf den ersten Blick einen günstigen Eindruck bezüglich seiner Verzweigungsweise. Der Ährchenanatz hätte dadurch vermehrt sein können, daß die Äste noch kräftiger geworden wären, wodurch die Stufenzahl sich hätte erhöhen können.

Obwohl die Verzweigungsweise von Borstlösa nicht als schlecht angesprochen werden darf, so hat er doch teilweise zu hohe Verzweigungen innerhalb der einzelnen Aststufen.

Der Unterschied in der Höhe der Verzweigung des oberen gegenüber dem unteren Rispen teil tritt bei Zigowohafer in erhöhtem Maße hervor. Sehr stark ist bei diesem Typus die basale Verzweigung. Vor allem aber sollte die Stufenzahl der Hauptäste vermehrt sein. Ähnlich wie bei Svittlinghafer, wenn auch in geringem Maße, steht im Doppelwickel der schwächere Wickel dem stärkeren verhältnismäßig nach.

Bei den Rispen des Duppauer Hafers bestand teilweise ein Mangel der Verzweigung darin, daß der obere Rispen teil eine verhältnismäßig geringe Verzweigung zeigte gegenüber den oft verhältnismäßig reich verzweigten Ästen der unteren Quirle.

Die Verzweigungsart der untersuchten Rispe von Leutenwitzer Gelbhafer war darin ungünstig, daß nicht nur hohe Basalverzweigungen aus den Ästen der einzelnen Quirle vorhanden waren, sondern daß auch insbesondere die einzelnen oberen Stufen übermäßig reich an hohen Verzweigungen waren.

Die schlaffrispigen Haferformen der Zuchtstämme N H 3, S H 2, der Stutz- oder Walddler Hafer und der Zuchtstamm F H 5, stehen im morphologischen Aufbau ungünstig. Vor allem zeigen sie eine hohe basale Verzweigung selbst bis zur vierten Stufe; die langen Äste besitzen nur wenig Stufen (eine bis zwei) und innerhalb dieser Stufen ist die Verzweigung eine sehr geringe (oft nur ein oder zwei Zweige).

Aus den Vergleichen geht hervor, daß verschiedene Rispen typen darin wesentlich verschieden sind, daß die einzelnen Ährchen bezüglich der Höhe der Verzweigungsordnungen und der Stärke der einzelnen Äste recht verschiedenartig angelegt sein können.

II. Die Qualitätsunterschiede der einzelnen Körner einer Rispe und die Verteilung der Körnerqualitäten in der Rispe.

A. Die Korngewichte.

Die ersten Untersuchungen über die Verteilung der Korngewichte innerhalb der Rispe führte von Rümker¹⁾ aus. Er konnte keine Gesetzmäßigkeit feststellen. Er schreibt: „ . . . , so habe ich an den Sorten, welche ich untersuchte, Göttinger, ver-

*) Journal für Landwirtschaft 1890, Seite 322.

besserter Rauener Hafer und dänischer Hafer, eine Verschiedenheit der Korngewichte in den verschiedenen Zonen der Rispe nicht entdecken können, also, wie es scheint, eine Abweichung gegen das Verhalten von ährentragendem Getreide. Die großen Körner scheinen also bei Hafer gleichmäßig über die ganze Rispe verteilt zu sein, und zwar sind es stets die Außenkörner, das heißt die primären, unter der äußersten Spelze sitzenden. Die darunter gebildeten zweiten und dritten Körner pflegen stets leichter zu sein.“

Dagegen fand Frumwirth Gesetzmäßigkeiten in der Verteilung der Korngewichte über die Rispe. *) Er sagt, daß die Hafer-rispe sowohl im ganzen Fruchtstand, als auch innerhalb eines Rispenastes ein mehr oder minder gleichmäßiges Ansteigen des Gewichtes der schwersten Körner der Ährchen gegen die Spitze zu zeigt. Darnach würden sich die schwersten Körner also an der Spitze des ganzen Fruchtstandes befinden. Später**) führte er wiederholte Wägungen mit demselben Resultat aus. Auch für die nackten Körner gilt nach Frumwirth diese Gesetzmäßigkeit. Krarup, ***) der die Korngewichte der Außenkörner für die unterste, die zweite und dritte Etage und die übrigen Etagen zusammen (nur Außenkörner) bestimmte, bestätigt die Angaben von Frumwirth. Meine eigenen Untersuchungen, welche, wie bemerkt, von einzelnen Rispen in größerer Anzahl ausgingen und an jeder Rispe die Gewichte sämtlicher Einzellkörner bestimmten, ergaben zunächst für die A u ß e n k ö r n e r folgendes:

1. Die Stellung des schwersten Kornes in der Rispe.

Aus der beigegeführten Tabelle läßt sich der Sitz des schwersten Kornes bei den untersuchten Rispen ersehen.

Die Ermittlungen berechtigen zu der Behauptung, daß das schwerste Korn auch außerhalb der Rispen Spitze an verschiedenen Stellen einer Rispe vorkommen kann. Die Angaben lassen sich genauer dahin erweitern, daß die Ährchen der Rispen Spitze und

*) Forschungen auf dem Gebiete der Agrikulturphysik, herausgegeben von E. Wollny, Band 15, Seite 73.

**) Fühlings landwirtschaftliche Zeitung, 56. Jahrgang, 1907, Seite 291.

***) Journal für Landwirtschaft 1905, Seite 94.

solche an Zweigen der I. oder II. Ordnung einer beliebigen Rispenstufe das schwerste Korn einer Rispe tragen können. Die Spitze ist jedoch als Sitz des schwersten Kornes besonders begünstigt.

Das schwerste Korn verteilte sich auf die einzelnen Quirle der von mir untersuchten Rispen folgendermaßen:

Das schwerste Korn traf in Prozenten der Anzahl der untersuchten Rispen auf:

Quirl	I	in	4	Rispen	=	5,3	%
"	II	"	7	"	=	9,3	%
"	III	"	10	"	=	13,3	%
"	IV	"	14	"	=	18,7	%
"	V	"	7	"	=	9,3	%
"	VI	"	6	"	davon 2 mal als Spitze	=	8,0 %
"	VII	"	18	"	16 " " "	=	24,0 %
"	VIII	"	9	"	8 " " "	=	12 %

In dem vierten Teil der untersuchten Rispen traf das schwerste Korn auf das Gipfelährchen des Gesamtfruchtstandes. Außerdem kam in vielen der übrigen Rispen das Gewicht des Außenkornes des Gipfelährchens dem schwersten Außenkorn der Rispe fast gleich, so daß der Unterschied noch innerhalb der Fehlergrenze lag. Ferner waren Quirl III und noch mehr Quirl IV im Vorkommen des schwersten Kornes besonders begünstigt mit zehn beziehungsweise vierzehn Fällen.

Diese Untersuchungen bestätigen demnach teilweise die Befunde von v. Rümker, daß das schwerste Korn an verschiedenen Stellen der ganzen Rispe sich vorfinden kann. Eine Gleichmäßigkeit in der Verteilung der schwersten Körner über die ganze Rispe konnte jedoch nicht beobachtet werden.

In der ersten Rubrik der folgenden Tabelle „Bezeichnung der Sorte“ sind die einzelnen Rispen gekennzeichnet. Zum Beispiel Strube Nr. 1 R 1 bedeutet die erste Rispe der von mir mit Nr. 1 bezeichneten Pflanze; Nr. 1 R 2 = zweite Rispe derselben Pflanze zc. Ist in der Bezeichnung nur die Nummer angegeben, so bedeutet das eine einhälmige Pflanze. Die mit „Quirl“ überschriebene Rubrik gibt Aufschluß, in welcher Stufe der Rispe (die Stufen sind in der Reihenfolge von unten nach oben numeriert) sich das schwerste Korn befindet. Die nächste Rubrik gibt die Höhe des Verzweigungsgrades, also die Verzweigungsordnungen, an. Die weitere Rubrik enthält die Zahl der Rispenstufen inklusive der Spitze.

Bezeichnung der Sorte	Quirl	Ordnung	Rispen= stufen inkl. Spitze
Beseler II Nr. 1 R 1	2	II	8
" Nr. 1 R 2	5	I	7
" Nr. 1 R 3	7=	Spitze	7
" Nr. 2 R 1	4	I	8
" Nr. 2 R 2	3	II	8
" Nr. 3	2	II	7
Strube Nr. 1 R 1	8=	Spitze	8
" Nr. 1 R 2	8=	"	8
" Nr. 1 R 3	7=	"	7
" Nr. 2 R 1	4	II	8
" Nr. 2 R 2	4	I	7
" Nr. 3	3	II	8
Pfiffelbacher Nr. 1	1	II	7
" Nr. 2 R 1	3	I	8
" Nr. 2 R 2	7=	Spitze	7
" Nr. 3	4	II	7
" Nr. 4	8=	Spitze	8
" Nr. 5	7=	"	7
Svalöfs Goldregen Nr. 1	4	II	8
" " Nr. 2	4	II	9
" " Nr. 3	8=	Spitze	8
" " Nr. 4	8=	"	8
" " Nr. 5	7	II	8
" " Nr. 6	6	I	8
Switling Nr. 1 R 1	3	II	7
" Nr. 1 R 2	6	I	7
" Nr. 2 R 1	7=	Spitze	7
" Nr. 2 R 2	7=	"	7
" Nr. 3	7=	"	7
Siogowo Nr. 1 R 1	4	I	8
" Nr. 1 R 2	2	II	7
" Nr. 1 R 3	6=	Spitze	6
" Nr. 2 R 1	7=	"	7
" Nr. 3	3	I	7

Bezeichnung der Sorte	Quirl	Ordnung	Rispen= stufen infl. Spitze
Borstlösa Nr. 1 R 1	2	II	8
" Nr. 2	7=	Spitze	7
" Nr. 3	2	III	8
" Nr. 4	5	I	7
" Nr. 5	4	I	9
Leutewitzer Nr. 1 R 1	8=	Spitze	8
" Nr. 1 R 2	4	II	7
" Nr. 1 R 3	3	I	7
" Nr. 2 R 1	3	II	8
" Nr. 2 R 2	4	I	7
" Nr. 3	7	I	8
Duppauer Nr. 1 R 1	7=	Spitze	7
" Nr. 1 R 2	8=	"	8
" Nr. 1 R 3	1	I	7
" Nr. 2 R 1	8=	Spitze	8
" Nr. 2 R 2	8	I	9
" Nr. 3	4	II	8
N H 3 Nr. 1 R 1	7=	Spitze	7
" Nr. 1 R 2	6=	"	6
" Nr. 2 R 1	1	I	7
" Nr. 2 R 2	7=	Spitze	7
" Nr. 3	2	II	7
" Nr. 4	5	I	7
S H 2 Nr. 1 R 1	5	I	7
" Nr. 1 R 2	6	I	8
" Nr. 1 R 3	2	I	6
" Nr. 2 R 1	4	I	7
" Nr. 2 R 2	7=	Spitze	7
" Nr. 3	4	II	7
Stutzhafer Nr. 1 R 1	7=	Spitze	7
" Nr. 1 R 2	7=	"	7
" Nr. 1 R 3	6	I	7
" Nr. 2 R 1	3	I	7
" Nr. 2 R 2	5	I	8
" Nr. 3	1	I	7

Bezeichnung der Sorte					Quirl	Ordnung	Nispen= stufen incl. Spitze
F	H	5	Nr. 1	R 1	7	I	8
"			Nr. 1	R 2	3	I	7
"			Nr. 2	R 1	4	II	8
"			Nr. 2	R 2	3	II	7
"			Nr. 3		5	I	8
"			Nr. 4		5	I	8


2. Die Korngewichtsverteilung innerhalb eines Astes und innerhalb einer Nispe.

Die Korngewichte innerhalb eines Astes sinken im allgemeinen von der Spitze abwärts mit der Zunahme der Verzweigungsordnungen, so daß am Anfange der Zahlenreihe das Spitzenkorn des Astes, am Ende dagegen das Korn der höchsten Verzweigung steht. Diese Gewichtsabnahme von der niederen zur höheren Ordnung ist jedoch keine feste Regel. Sehr oft nähern sich die Gewichte der Körner an zwei aufeinanderfolgenden Verzweigungsordnungen zum Beispiel I. und II. Ordnung oder II. und III. Ordnung zc.; öfter ist auch das Außenkorn eines Ährchens der nächsthöheren Ordnung schwerer als das der vorhergehenden Ordnung.

Innerhalb eines Astes gehört das Spitzenkorn für sich der niedrigsten Ordnung an; infolgedessen ist es auch größtenteils das schwerste Korn des Astes, entsprechend dem Spitzenkorn des Gesamtfruchtstandes.

Innerhalb der einzelnen Ordnungen aa, bb, cc usw. (vergleiche nachstehende Figur) läßt sich für die Korngewichte keine bestimmte Reihenfolge (etwa nach der Reihenfolge der Stufen) angeben.

Jedoch kommt es sehr häufig vor, daß bei Ästen, die in ihren unteren Stufen in plötzlicher Zunahme eine sehr starke Verzweigung aufweisen (Figur A) in der gleichen Ordnung die Korngewichte in den reichverzweigten Stufen bedeutend herabgedrückt werden. Wenn hingegen eine allmähliche Zunahme der Verzweigungsordnungen in den einzelnen Stufen von oben



nach unten besteht (Figur B, dieser Ast hat auch eine geringere Höchstverzweigung), so schwanken die Korngewichte in den einzelnen Ordnungen ihrer verschiedenen Stufen um eine bestimmte Größe, so daß besonders hier in der gleichen Ordnung das Korn der untersten Stufe gerade so schwer oder schwerer (je nach Stärke der Äste) sein kann als in den oberen Stufen.

Betrachtet man die Verteilung der Korngewichte über die ganze Rispe, so sinken zwar ebenfalls im großen ganzen die Korngewichte mit Zunahme der Höhe der Verzweigungsordnungen bis zu den höchsten Ordnungen in der untersten Rispenstufe. Daß aber Abweichungen von dieser Abnahme der Korngewichte bestehen, zeigen schon die Feststellungen über den Sitz des schwersten Kornes und, hievon abgesehen kommt im Vergleich von Zweigen gleicher Ordnung verschiedener Rispenstufen vielfach vor, daß Zweige von tiefer an der Hauptspindel entspringenden Quirlen schwerere Körner haben als solche von höheren. Noch besser als im Vergleich einzelner Äste läßt sich an der ganzen Rispe eine deutliche Abnahme der Korngewichte von Ährchen an Zweigen gleicher Ordnung in reichverzweigten unteren Rispenquirlen konstatieren, während die Korngewichte von Ährchen aus gleichen Verzweigungsordnungen im oberen Rispentheil von der Reihenfolge der Stufen unabhängig wechselnd, größer oder geringer sein können.

Dies ist besonders gut bei Rispfen zu beobachten, die im oberen und mittleren Teil der Rispe in Bezug auf die Verzweigung ziemlich gleichmäßig gebaut sind, bei denen aber der unterste und eventuell auch der zweite Quirl hohe Verzweigungsordnungen aufweisen.

Die größere Zahl der Verzweigungsordnungen in den unteren und besonders in der untersten Stufe bringt mit sich, daß die Einzellorngewichtsdifferenzen bei den einzelnen Quirlen im unteren Teil der Rispe größer sind als im oberen.

Durch die oben erwähnte reichzählige, besonders hohe basale Zweigbildung der unteren Stufen der Äste in der ganzen Rispe wird die Gleichmäßigkeit der Körner besonders beeinflusst.

Aus dem Gesagten geht hervor, daß es von besonderem Vorteil für die Erzielung einer möglichst gleichmäßigen Körnerernte ist, wenn bei einem Rispentypus vor allem eine zu hohe Verzweigung vermieden ist, insbesondere die hohe Verzweigung an der Basis.

Infolgedessen wäre der Aufbau des Astes Figur B (Seite 19) dem des Astes Figur A in Bezug auf die Gleichmäßigkeit der Körner vorzuziehen. Dasselbe trifft für analogen Rispfenbau zu.

3. Die mittleren Korngewichte der einzelnen Stufen einer Rispe und eines Astes.

Es ist die Folge der in Ziffer 2 dargelegten Einzellorngewichtsverteilung, daß die mittleren Korngewichte von der Spitze zur untersten Stufe abnehmen und zwar umsomehr, je reicher sich die Stufen nach abwärts verzweigen, das heißt je höhere Verzweigungsordnungen sie bilden. Im untersten Quirl ist das mittlere Korngewicht ausnahmslos am niedrigsten

Gewöhnlich ist das mittlere Korngewicht beim zweiten Quirl wenig verschieden von dem des ersten, wie denn auch bei beiden meistens die Verzweigung ähnlich weit geht. Im großen ganzen ist vom dritten Quirl aufwärts die Zunahme der mittleren Korngewichte ziemlich deutlich, wenn auch durch Unregelmäßigkeiten in der Rispe in einem oder dem andern Quirl das mittlere Korngewicht niedriger sein kann als in dem des nächst unteren Quirls.

Die Abnahme der Mittelgewichte von oben nach unten zeigt sich auch bei den Mittelgewichten im Vergleich der Verzweigungen

gleicher Ordnung, hier jedoch nur im allgemeinen, da gerade hierbei die besondere morphologische Beschaffenheit des oberen Teils einer Rispe im Verhältnis zur Verzweigungsweise im unteren Teil von Einfluß ist. (Siehe Erläuterung bei der Einzelkorngewichtsverteilung.)

Im einzelnen Quirl sinken die mittleren Korngewichte mit Zunahme der Verzweigungsordnung. Der Gewichtsabfall ist bei den unteren Quirlen stärker als bei den oberen. (Siehe die Tabellen Seite 76—93.)

Des Verhaltens der mittleren Korngewichte der einzelnen Äste innerhalb eines Quirls wird unter 4. Erwähnung getan. Eine sehr reichliche Verzweigung bis zu hohen Ordnungen kann sowohl im mittleren und oberen Teil der Rispenäste als auch an der Basis dieser stattfinden, was sortenweise verschieden ist. Greifen wir zwei nach der Art der Verzweigung extreme Formen meines Materials heraus, so hat Beseler Hafer II reiche Verzweigung aus den mittleren und oberen Stufen der Äste, N H 3 aber eine geringe. Dem entspricht bei Beseler Hafer eine größere Abnahme im mittleren Korngewicht von der Spitze zum mittleren Korngewicht der unteren Stufe als bei N H 3, ferner eine größere Gleichmäßigkeit der Körnergewichte von N H 3 als von Beseler Hafer, wenn man nur die Korngewichtsmittel für den mittleren und oberen Teil der Rispenäste betrachtet. Was aber die Gesamtheit der Körner eines Quirls anbelangt, so wird die Gleichmäßigkeit in den Korngewichten bei N H 3 bedeutend herabgedrückt durch die Basalverzweigung, welche viel reichlicher ist und damit mehr höhere Verzweigungsordnungen enthält als bei Beseler Hafer.

4. Die Korngewichte in ihrem Verhältnis zu den Längen und Dicken der einzelnen Äste mit besonderer Berücksichtigung der Verzweigungsart. — Einfluß der Aststärke und Verzweigungsart auf die Gleichmäßigkeit der Korngewichte.

Über die Verhältnisse der Längen der einzelnen Äste zu dem mittleren Gewicht ihrer Körner und zu den Veränderungen in den Gewichten der Körner der Gipfelährchen der ein-

zelnen Verzweigungen mit Zunahme der Höhe der Verzweigungsordnungen gibt die Tabelle folgende Aufschlüsse (siehe Tabelle Seite 94—98).

1. Innerhalb eines Quirls sinken im Vergleich der Äste verschiedener Ordnung mit Abnahme der Astlängen die mittleren Korngewichte der einzelnen Äste.

2. Das gleiche gilt für die Gewichte der Körner der Gipfelährchen der einzelnen Verzweigungen.

Die Länge der Äste in jedem Quirl nimmt mit der Höhe der Verzweigungsordnung durchweg ab, mit ihr auch das Gewicht der Körner der Gipfelährchen und das mittlere Korngewicht der einzelnen Äste. Die Abnahme der Gewichte der Körner der Gipfelährchen erleidet jedoch mitunter bei zwei benachbarten Verzweigungsordnungen Ausnahmen.

Obige Beziehungen zwischen Astlängen und Korngewichten werden vielfach durch den Einfluß der unterschiedlichen Astdicken verändert. Wenn ein Ast zweiter Ordnung ähnlich dick ist, wie sein Mutterast (I. Ordnung), so stehen die mittleren Korngewichte der beiderlei Äste einander nahe. Daß die Körner der Gipfelährchen solcher benachbarter Zweige einander im Gewichte gleichkommen können, oder daß das Gewicht des Kornes des Gipfelährchens im Zweige der II. Ordnung größer sein kann, als das am zugehörigen Zweige I. Ordnung, wurde schon oben bemerkt.

Es kann also der nachteilige Einfluß, den die höhere Ordnung auf die Gleichmäßigkeit der Körner ausübt, durch eine entsprechende Stärke der Zweige einigermaßen ausgeglichen werden. Infolgedessen wäre bei der Auswahl der Rispen darauf zu sehen, daß die einzelnen Quirle unter sich möglichst gleich starke Äste besitzen.

Was die Gewichte der einzelnen Körner der Zweige gleicher Ordnung eines Astes und auch einer ganzen Rispe anbelangt, so stehen sie nicht im Verhältnis zu den Astlängen beziehungsweise Astdicken. Denn während die Körner der Zweige einer und derselben Ordnung um eine bestimmte Größe schwanken, nehmen die Äste der I. Ordnung (siehe Figur Seite 19), und ebenso auch die der übrigen Ordnungen im Vergleich miteinander von unten nach oben an Stärke ab. Die Anzahl der Zweige und die Höhe der Verzweigungsordnungen, die von den Ästen der I. Ordnung aus-

gehen, nimmt aber in gleicher Richtung ab. Es wird die Verzweigung aus den Ästen I. Ordnung umso reichlicher sein, je stärker die Äste sind. Es steht also die Aststärke im direkten Verhältnis zunächst zur Anzahl der daraus entspringenden Zweige (zur Zahl der Stufen), dann zur Höhe der Verzweigungsordnung.

Daraus ist zu folgern, daß die unteren Äste I. Ordnung nicht übermäßig stärker sein sollen als die oberen, für den Fall, daß diese Stärkezunahme sehr hohe Verzweigungsordnungen, sowohl an der Basis als auch am oberen Teil der Äste mit sich bringt. Außert sich jedoch das Stärkerwerden der Äste in den unteren reichverzweigten (gewöhnlich den zwei untersten) Stufen so, daß die Äste niederer Ordnung viele Stufen erzeugen, aus denen selbst wieder reichlich Zweige auf dem Wege der Vermehrung der Stufenzahl, aber nicht durch Entstehung hoher Verzweigungsordnungen entspringen, so wird durch die erwähnte Zunahme der Stärke der unteren Äste eine große Gleichmäßigkeit der Korngewichte in der ganzen Rispe erreicht.

Wenn ich oben (Seite 19) bei der Korngewichtsverteilung über die Äste gesagt habe, daß eine allmähliche Zunahme der Zahl (der Höhe) der Verzweigungsordnungen von oben nach unten eine gleichmäßigere Verteilung der Korngewichte zur Folge habe als eine plötzliche, so soll damit diese Verzweigungsweise nicht als Ideal des Aufbaues einer Rispe hinsichtlich der Korngleichmäßigkeit hingestellt sein. Die größte Gleichmäßigkeit in den Korngewichten wäre vielmehr bei Rispen vorhanden, bei denen nicht nur die Zunahme der Zahl der Verzweigungsordnungen recht allmählich ist, sondern auch im oberen Rispenteil viele Zweige niederer Ordnung (viele Stufen der einzelnen Äste) stehen und besonders auch die Basaläste nicht hoch verzweigt sind. Bei meinem Untersuchungsmaterial kam es selten vor, daß die Höhe der Verzweigungsordnungen im oberen Teil der Äste jene der Basalregion erreichte. Daß gerade diese höchsten Verzweigungen das durchschnittliche Korngewicht bedeutend herabdrücken, wurde schon oben erwähnt. Der Umstand jedoch, daß die Körner an den Spitzen der einzelnen Zweige der Basalverzweigungen im großen ganzen schwerer sind als die Körner, die an Zweigen jeglicher Ordnung in den oberen Verzweigungen der Äste des nämlichen Quirls gebildet werden (vergleiche in den Tabellen die

schiefgestellten Zahlen), hat zur Folge, daß die Unterschiede in der Gleichmäßigkeit der Körner der beiden extremen Typen, der Steif- und Schlaffrispe (siehe unten) einigermaßen abgeschwächt werden.

In nachstehendem will ich versuchen an Hand meiner Aufzeichnungen, die hier des großen Umfangs wegen nicht wiedergegeben werden können (nähere Beschreibung der Verzweigungsart siehe erster Teil Seite 11 u. ff.), ferner im Vergleich mit den Größensortimenten deren Verhältnis sowohl aus nachstehender Tabelle als auch aus der graphischen Darstellung ersichtlich ist, die Gleichmäßigkeit der Korngewichte der einzelnen Haferforten zu erörtern, und nachzuweisen, daß in der Hauptsache durch die Art der Verzweigung die Grundlage des Grades der Gleichmäßigkeit in den Gewichten der Körner einer Rispe gegeben ist.

Für die Sortierungen wurden Blechsiebe mit Längsschlitzen verwendet und damit 8 Sortimente gewonnen. Die Größen $<1\frac{6}{8}$ und $<1\frac{7}{8}$ wurden als Auspuß zusammengeworfen. Die graphischen Darstellungen sind sowohl nach den Mengen aller einzelnen Sortimente, als nach den vereinigten Mengen benachbarter Größen angefertigt. Das Sortiment $<2\frac{2}{8}$ und $>2\frac{1}{8}$ mm umfaßte die Hauptmenge der Körner und blieb für sich. (Siehe Tafel 5 und anschließende Tabelle.)

Bei der kritischen Vergleichung der untersuchten Sorten in Bezug auf die Sortierungsergebnisse bin ich von dem Standpunkt ausgegangen, daß die Gleichmäßigkeit umso größer sei, je mehr Körner einer Probe einander nächststehender Sortimente angehören.

Einer der gleichmäßigsten Hafer in dem angegebenen Sinne ist Svalöfs Goldregenhafer. Im Gegensatz dazu stehen die schlaffrispigen Hafer, respektive die Hafer mit hohen Verzweigungen an der Basis, diesen schließt sich auch das untersuchte Material von Leutenwitzer Gelbhafer an.

Hinsichtlich der Beziehungen der Verzweigungsverhältnisse der untersuchten Rispentypen (vergleiche oben Seite 11) zur Korngleichmäßigkeit möge noch folgendes bemerkt sein.

Die steifrispigen Sorten besitzen im allgemeinen eine größere Gleichmäßigkeit als die schlaffrispigen.

Bei Weseler Hafer würde unstreitig die Gleichmäßigkeit der Korngewichte erhöht sein, wenn die Hauptäste mehr Stufen produzieren würden und hauptsächlich die basale Verzweigung etwas verringert wäre.

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Sorte	$<1\frac{1}{8}$ mm	$<1\frac{1}{4}$ mm	<2 mm	$<2\frac{1}{8}$ mm	$<2\frac{1}{2}$ mm	$<2\frac{3}{8}$ mm	$<2\frac{1}{2}$ mm	$<2\frac{1}{2}$ mm
1	Beiseler II	0,914	0,619	5,988	7,778	30,855	23,343	19,144	11,357
2	Strube	1,882	1,618	8,430	14,734	45,615	17,407	10,312	
3	Wiffelbacher	1,948	0,863	6,727	14,267	42,058	17,229	12,590	4,317
4	Wittling	1,122	0,671	4,419	7,706	28,908	21,914	22,124	13,136
5	Swalöfs Goldregen	6,666	2,005	20,018	21,884	39,285	10,142		
6	Worfflösa	2,487	1,883	9,589	20,428	40,478	16,242	8,894	
7	Ligorno		2,432	4,476	4,283	22,617	19,992	21,599	24,601
8	Leutenwiger	10,705	4,771	25,170	36,006	19,868	3,478		
9	Duppauer	2,934	1,552	7,998	16,053	34,680	17,955	12,986	5,840
10	N H 3	9,689	2,441	22,903	25,558	32,484	6,926		
11	S H 2	16,980	4,753	29,637	27,549	18,583	2,498		
12	Stuhhafer	15,954	3,724	21,369	28,626	25,586	4,741		

Die Verzweigungen der einzelnen Stufen von Strubes Hafer gehen im allgemeinen zu hoch zur Erzeugung einer großen Gleichmäßigkeit.

Pfiffelbacher Hafer müßte, um größere Gleichmäßigkeit seiner Korngewichte zu erhalten, vor allem im oberen Rispenanteil verhältnismäßig reicher verzweigt sein, innerhalb seiner Äste ist die plötzliche Zunahme der Verzweigungen von Stufe zu Stufe ebenfalls der Korngleichmäßigkeit nachteilig.

Auch bei Hvitlinghafer sollte die Verzweigung im oberen Rispenanteil größer sein, dagegen sollten die Verzweigungen innerhalb der einzelnen Stufen der Äste zu weniger hohen Ordnungen gehen, auch sollten mehr gleichmäßig starke Basaläste vorhanden sein.

Die günstige Verzweigung von Svalöfs Goldregenhafer wäre in Richtung der Korngleichmäßigkeit noch mehr begünstigt, wenn die Verzweigung im oberen Rispenanteil im Verhältnis zum unteren noch größer wäre.

Das gleiche gilt für Borstlösa; bei diesem Hafer aber sollten außerdem die hohen Verzweigungen einzelner Äststufen nicht vorhanden, dafür sollte die Stärke der Äste gleichmäßiger sein.

Die Gleichmäßigkeit von Ligowohafer wird durch den starken Abfall in der Verzweigung nach oben zu stark herabgedrückt. Während die Körner der oberen Quirle infolge der geringen Verzweigung sehr gut ausgebildet werden können, werden im untersten Quirl die Einzellkorngewichte schon durch die große Anzahl von Verzweigungen, sowie durch die sehr hohen Verzweigungsordnungen herabgedrückt.

Das gleiche gilt für Dupppauer Hafer.

Von der Zuchtstelle des Leutewitzer Gelbhafers wurde gelegentlich der Weltausstellung in Paris*) folgende Bemerkung gemacht: „Für den Typus des Leutewitzer Gelbhafers ist das Fortschreiten des Rispenbesatzes von oben nach unten und damit zusammenhängend auch das Korngewicht von Quirl zu Quirl in geometrischer Progression charakteristisch und wird bei der Zuchtwahl berücksichtigt.“ Nach meinen Befunden dürfte es kaum möglich gewesen sein, bei der Auswahl beide Punkte derart zu vereinen, daß von einer geometrischen Progression die Rede sein kann. Diese Art der Auswahl darf nach meinen Untersuchungen

*) Die deutsche Landwirtschaft auf der Weltausstellung in Paris 1900, Seite 404.

als der Gleichmäßigkeit der Körner nachteilig bezeichnet werden, die Zahl der Körner allerdings wurde dadurch vermehrt. Die hohen Verzweigungsordnungen der schlaffrispigen Hafer drücken die Gleichmäßigkeit im Korngewicht sehr stark herab. Gute Gleichmäßigkeit wird erst durch starke Sortierung erzielt.

5. Der Einfluß der Stellung und Zahl der Körner im Ährchen und der Begrannung auf das Gewicht der Körner.

Die Gewichtsunterschiede der einzelnen Körner einer Rispe und die Verteilung der Korngewichte in der Rispe hängt außer von dem Verzweigungsverhältnisse noch von folgenden*) Umständen ab:

1. Von der Stellung der Körner im Ährchen.
2. Von der Zahl der Körner im Ährchen.
3. Von der Begrannung.

Nach der Stellung der Körner im Ährchen werden Außen-, Zwischen- oder Mittelförner und Innenförner unterschieden.

Von der Gewichtsverteilung bei den Körnern eines Ährchens ist bereits bekannt, daß das Außenkorn schwerer als das Mittelforn, dieses wieder schwerer als das eventuell vorkommende Innenkorn ist.

Bisher wurde lediglich vom Gewicht der Außenförner gesprochen. Was das Verhältnis der Gewichte von Außen- zu Innenförnern anlangt, so habe ich die beiden Sorten Beseler und N H 3 darauf untersucht und gefunden, daß das Verhältnis sowohl innerhalb der gleichen als auch mit den einzelnen Ordnungen sehr stark schwankt, es macht sich aber ein Abfall des Gewichtes der Innenförner mit Zunahme der Höhe der Verzweigungsordnung bemerkbar, der bei N H 3 ziemlich deutlich hervortritt. Es scheint also auch die Ausbildung der Innenförner mit der Höhe der Verzweigung zusammenzuhängen. Die Rispen mit hoher Verzweigung geben durch ihre mit der Höhe der Verzweigungsordnung im Verhältnis kleiner werdenden Innenförner mehr Ausputzware.

*) Auf den Einfluß der Ausblühfolge wurde schon oben hingewiesen (Seite 6). Diese Folge und auch die Reifung schreitet von der niederen zu den höheren Ordnungen fort und im ganzen so, daß je die zeitiger reisenden Körner schwerer werden als die später reisenden. Je höher die Verzweigungsordnung geht, umso größer ist die Gefahr, daß bei ungünstigen äußeren Verhältnissen überhaupt nur kümmerliche Körner sich ausbilden oder die Blüten ganz taub werden.

Verhältnis von Innen- zu Außenform.

Erläuterungen für die Tabellen:

Sp = Spitze, Qu = Quirl = Scheinquirl, E = einzelnes Korn.

Die Quirle sind an der Spitze von unten nach oben gezählt.

Die römischen Zahlen geben die verschiedenen Ordnungsgrade an.

Bei — konnte das Verhältnis der Korngewichte wegen mangelhafter Ausbildung eines Kornes nicht ausgedrückt werden.

B e s e l e r.

Nr. 1 R 1							Nr. 1 R 2					
	I	II	III	IV	V	VI		I	II	III	IV	V
Sp	68,7						Sp	75,4				
Qu 7	66,9						Qu 6	68,0				
" 6	68,9	69,3					" 5	42,5	72,6			
" 5	69,3	66,5					" 4	69,2	—			
" 4	70,0	—					" 3	71,4	56,3	72,2		
" 3	70,0	66,6					" 2	—	66,9	68,8	69,4	
" 2	69,4	67,1	68,4				" 1	69,3	64,5	64,8	31,4	
" 1	61,8	63,2	62,3			E	" 1	69,3	64,5	64,8	31,4	
		64,2	63,7	62,3					73,1	—	—	
		67,1	65,5	66,9					64,9	—	—	
		61,9	67,4	63,7					73,4	51,3	—	
			67,2	63,7					63,1	57,9	59,8	
			72,1	65,6						72,9	60,0	
			64,6	92,9						70,9	—	
			62,7	72,4						70,2	64,5	
			68,3	—							65,7	
			74,8	62,8							60,9	
				59,8								
				69,1								
			64,2	72,0								
				—								
				69,7	51,4							
					52,6							

N H 3.

Nr. 1 R 1						Nr. 1 R 2					
	I	II	III	IV	V		I	II	III	IV	V
Sp	60,6					Sp	57,8				
Qu 6	54,1					Qu 5	59,7				
" 5	46,9	49,7				" 4	38,6	—	44,9		
" 4	49,8	51,8				" 3	46,9	33,8			
		52,9	54,5					33,4			
" 3	54,1	51,9				" 2	—	30,2	37,7	35,9	
		45,9	48,4					44,8	—	E	
" 2	54,4	62,5	46,2	38,4				32,3	39,9		
		48,9	35,1			" 1	45,8	27,6	41,9	E	E
		37,3	39,5		E			32,5	34,3		
			46,8	—				39,9	—		
		47,2	33,4	32,8					—		
			—	—				40,4	—		
" 1	41,2	27,8	E	35,4	E				E	E	E
		41,2	—						33,6		
		35,6	—								
			E								
			38,8	E							
				E							
		39,3	38,7								
				E							
			47,3	—	E						
			35,3	—	E						
				E	E						
				—	E						

NH 3.

Nr. 2 R 1							Nr. 2 R 2						
	I	II	III	IV	V	VI		I	II	III	IV	V	VI
Sp	f						Sp	62,5					
Qu 6	f						Qu 6	63,7					
" 5	f	f					" 5	—	54,3				
" 4	56,0	f					" 4	—	41,4				
		—	56,2				" 3	56,1	—	55,2	45,9		
" 3	65,7	54,6	53,3				" 3	—	—	57,3			
		56,9	58,2					55,4	40,7				
			53,8	55,6			" 2	58,7	51,0				
" 2	66,5	53,6	49,4					47,6	51,6				
		57,8	61,8					59,8	56,0				
		50,9	54,1	53,9	44,5			41,3	48,3	49,0	E		
			52,8	—					55,7				
			56,4	—					53,1				
" 1	58,6	60,5	48,1						52,9	53,6			
		44,1	54,6				" 1	58,3	54,4	47,9	44,2		
		56,6	52,8					50,0	52,6	44,4			
			55,3	43,1				50,0	51,2				
			53,9	48,6					52,6	31,1			
			41,5	—	E				45,9	—			
	28,9	56,5	49,7	50,4				55,9	64,9	—	31,5		
		54,4	45,3						62,6	54,7	48,5		
		47,9	44,9	52,5					59,1	50,5	35,9		
			47,1	51,1						—	50,0		
				50,3	E						29,4	E	

N H 3.

Nr. 3							Nr. 4						
	I	II	III	IV	V	VI		I	II	III	IV	V	VI
Sp	f						Sp						
Qu 6	55,2						Qu 6	69,3					
" 5	57,6	51,5	52,5				" 5	55,3	49,7				
" 4	60,2	50,8	46,2				" 4	57,9	53,5	45,1			
		54,2	55,1					—	61,0				
" 3	61,1	52,6					" 3		57,8	58,3			
		56,1	53,6					62,9	55,9				
		56,2	57,6						56,6	51,4			
			60,1	58,1					—	—			
" 2	56,2	49,6					" 2		50,4	50,9	—		
		49,9	47,9					58,9	48,4				
		—	55,7						51,4	47,4			
			51,7	44,0	46,1				52,2	57,1	45,2		
		47,1	49,3							57,6	41,9	37,4	
			—	45,4					48,4	41,8			
			52,1	48,0						48,8	41,2	—	
			42,2	46,8						47,9	42,7		
" 1	52,4	—					" 1			43,9	E	E	
		46,3	51,1					49,6	45,5				
		47,8	52,2						44,4				
			55,0	48,1					50,8	—			
			—	41,3	E				41,3	38,0			
		63,9	56,1	50,0						46,7	—		
			37,1	46,2	E					—	—		
			46,6	46,4	E						44,9	E	
			48,7		E	E			54,5	48,7	42,8		
										45,7	40,0		
											49,5	42,3	
										27,2	—		
											35,6	E	
											37,9	E	
												E	E

Das Gesamtgewicht aller Körner eines Ährchens ist ebenfalls entsprechend der Höhe der Verzweigungsordnungen über die ganze Rispe verteilt; auch hier ist der Abfall mit Zunahme der Höhe der Verzweigungsordnung gesteigert durch die oben erwähnte Abnahme der Innenforngewichte.

Die (hier nicht mitgeteilten) Tabellen geben Aufschluß über die Zunahme der Korngewichte mit der größeren Anzahl der Körner im Ährchen. Diese Tatsache wurde schon früher von Nilsson erkannt: „Je mehr Körner im Ährchen stehen, desto größer sind die Körner, und es zeigte sich ohne Ausnahme, daß immer das Gewicht der Körner in jedem Ährchen mit der Zahl derselben steigt.“

Diese Behauptung kann nicht nur mit der Drei-, sondern auch mit der Einförnigkeit bewiesen werden, da in einem einblütigen Ährchen das Gewicht der Körner ohne Ausnahme viel geringer ist, als das des Außenforns eines mehrförnigen Ährchens der gleichen Ordnung.

Es ist aber beizufügen, daß bei *B e r f ü m m e r u n g* eines der Körner im Ährchen eine Gewichtszunahme des anderen Kornes, gleichviel ob Außen- oder Innenforn, stattfinden kann, was die Gewichts Differenz gegenüber den Körnern mehrförniger Ährchen abschwächt und mitunter ausgleicht.

In dem von mir untersuchten Material war Dreiförnigkeit sehr stark bei Sigowohaser vertreten, während bei Beseler, Svittling, Duppauer und Leutewitzer diese Erscheinung im allgemeinen weniger auftrat. Jedoch hatte zum Beispiel Duppauer Nr. 1 R 1 und Leutewitzer Nr. 3 sehr viele dreiförnige Ährchen.

Daß bei Hafer mit der Begrannung eine Erhöhung des Korngewichtes verbunden ist, wurde schon von anderer Seite nachgewiesen auf Grund von Mittelproben begrannter und unbegrannter Körner. Aus meinen Aufzeichnungen ist dies Verhältnis deutlich zu erkennen.

Da die begrannnten Körner und ebenso die dreiförnigen Ährchen in der Hauptsache an den Verzweigungen der Rispe da vorkommen, wo überhaupt die schwereren Körner sich entwickeln, nämlich an der Spitze der Hauptspindel und im obersten Teil der stärkeren Äste, so befördert die Begrannung und die Mehrförnigkeit der Ährchen noch diesen Vorzug der bezeichneten Rispen-

regionen in Bezug auf das mittlere Korngewicht, während die Einkörnigkeit, die fast immer in den höheren Verzweigungsordnungen auftritt, das mittlere Korngewicht stark herabmindert.

B. Die Spelzengewichte.

Die Betrachtung der prozentischen Spelzengehalte der einzelnen Körner mit Bezug auf die Verteilung in der Rispe, sowohl im ganzen wie bei den einzelnen Ästen ergibt, daß die Spelzengehalte entgegengesetzt der Abnahme der Korngewichte von oben nach unten in gleicher Richtung zunehmen bis zu den höchsten Verzweigungen in der untersten Rispenstufe. Die schwereren Körner einer Rispe haben sonach im allgemeinen die geringeren Spelzengehalte.

Wie Seite 18 gezeigt, bestehen aber in den Beziehungen zwischen Korngewichten und Stellung der Körner an den Rispenzweigen vielfach Abweichungen. Dasselbe trifft auch für die Spelzengehalte und zwar noch häufiger zu.

Die Begrannung erhöht die Spelzengehalte, so daß also bei den begrannten Körnern die erwähnte Beziehung zwischen Zunahme des Korngewichtes und Abnahme der Spelzengehalte nicht zutrifft.

Bemerkenswert ist, daß vielfach von ungefähr gleichschweren Körnern einer Rispe dasjenige geringeren Spelzengehalt hat, welches an einem Zweig niedrigerer Ordnung des gleichen Quirls oder verschiedener Quirle ein und derselben Rispe steht.

Da im großen ganzen die Spelzengehalte mit Abnahme der Korngewichte zunehmen, die mittleren Korngewichte einer Rispe aber von der Spitze bis zur untersten Stufe abnehmen, so ist zu erwarten, daß die mittleren Spelzengehalte in gleicher Richtung zunehmen. Dies bestätigen auch die Bestimmungen auf Seite 105.

Die Vergleichen der untersuchten Rispentypen haben zu dem Schluß geführt, daß mit Bezug auf die erwünschte Gleichmäßigkeit der Korngrößen diejenigen Typen als die besseren erscheinen, welche sich aus einer großen Zahl starker Äste mit möglichst vielen Stufen zusammensetzen. Die Verzweigungen aus den einzelnen Stufen sollen nicht zu hoher Ordnung sein und namentlich sind reichzählige, basale Wickel nicht erwünscht. Rispen dieser

Aufbauart sind aber auch mit Bezug auf die Spelzengehalte erwünscht, da ihr Körnerertrag zum verhältnismäßig größeren Teil aus Körnern geringeren Spelzengehaltes besteht. Aus den Untersuchungen läßt sich ferner ableiten, daß Rispen von gleichem mittleren Spelzengehalt hinsichtlich der Größe der Spelzengehalte der einzelnen Körner beträchtlich voneinander verschieden sein können, was auch wieder auf die Höhe, überhaupt auf die Art der Verzweigung größtenteils zurückzuführen ist.

Wenn wir die Bestimmungen der Tausendforngeichte und der Spelzengehalte miteinander vergleichen, so ergibt sich folgendes: In der Reihenfolge der in der Tabelle aufgezählten Sorten bemerkt man eine deutliche Abnahme des Tausendforngewichtes und gerade entgegengesetzt steigen die Spelzengehalte; jedoch treten hier und da große Schwankungen in diesem Verhältnis ein. Es kommt dabei auf das Mengenverhältnis an, in dem die einzelnen Korngrößen gemischt vorhanden sind. Das Spelzengewicht von S H 2 ist besonders groß, da die Rispen dieser Form viele einkörnige Ährchen besaßen. Wie oben nachgewiesen, besitzen die Körner solcher Ährchen geringes Gewicht bei ganz bedeutend erhöhten Spelzengehalten.

Name der Sorte	Tausendforn- gewicht	Spelzen- gewicht
Vigowo	100	100
Övitling	98,5	100,9
Beseler	97,1	101,3
Strube	95,5	102,3
Pfiffelbacher	95,2	106,0
Duppauer	94,6	100,7
Borstlösa	90,8	99,9
N H 3	83,4	112,8
Öv. Goldregen	80,9	98,8
Stughäfer	77,6	108,7
Leutewiger	76,1	93,4
S H 2	74,1	116,7

Für die Gewichte der nackten Außenkörner gilt im großen ganzen dasselbe wie für die bespelzten, nur mit dem Unterschied, daß der Abfall im Gewicht zu den höchsten Ordnungen und besonders bei Rispen mit reicher Verzweigung in den beiden untersten, hauptsächlich im ersten Quirl stärker ist als bei den bespelzten. Die Ursache hiefür liegt in der Verteilung der Spelzengehalte.

Daß die Spelzengehalte der Innenkörner einige Prozent niedriger sind als die der Außenkörner*), bestätigt die folgende Tabelle.

Name der Sorte	Spelzengewicht d. Außenkörner	Spelzengewicht d. Innenkörner
	%	%
N H 3 Nr. 1 R 1	38	29
" Nr. 3	31,9	22,2
" Nr. 4	33,7	25,6
Beseler Nr. 1 R 1	30,8	26,6
" Nr. 1 R 2	31,7	27,2
" Nr. 1 R 3	33,5	24,5
" Nr. 2 R 1	29,8	25,4
" Nr. 2 R 2	29,8	24,7
" Nr. 3	31,5	27,5
Sv. Goldregen Nr. 1	31,6	24,9
" Nr. 2	29,2	25,9
" Nr. 3	28,9	23,9
" Nr. 4	30,1	24,8
" Nr. 5	30,6	25,3
" Nr. 6	30,9	27,1

*) Raum, zur Kenntnis der morphologischen Veränderungen der Getreidekörner unter dem Einflusse klimatischer Verhältnisse.

Zusammenstellung der Hauptergebnisse.

Aus den Untersuchungen ergeben sich folgende Hauptresultate:

1. In Übereinstimmung mit den Untersuchungen von Frumwirth und Krarup wurde gefunden, daß die Korngewichte von der Spitze zur Basis, sowohl in der ganzen Rispe, wie in deren einzelnen Ästen abnehmen. Jedoch ist diese Abnahme in verschiedenem Maße ausgeprägt; auch finden sich vielfach Abweichungen bei den einzelnen Körnern vor.

Die bezeichnete Abnahme kommt bei verschiedenen Rispenotypen darin abweichend zum Ausdruck, daß sie innerhalb einer Rispe und auch in deren einzelnen Teilen relativ größer oder geringer ist.

2. Das schwerste Korn einer Rispe kann sich an verschiedenen Stellen dieser befinden; vielfach sind Körner ähnlicher Schwere an den Spitzen der meisten stärkeren Äste I. und II. Ordnung in allen Quirlen einer Rispe vorhanden. Die von v. Rümker untersuchten Rispen scheinen hinsichtlich der erwähnten Verteilung der schweren Körner besonders gleichmäßig gewesen zu sein.

3. Innerhalb der einzelnen Quirle ist der Abfall in den Korngewichten umso stärker, je höher die Verzweigungsordnungen gehen; er ist deshalb am stärksten beim untersten Quirl. Dementsprechend sind auch die Korngewichtsunterschiede am größten bei jenen Ästen, welche zwei oder gar drei basale, reichzählige Wicel bilden. Starke Äste eines Quirls erzeugen Körner von höherem mittleren Gewicht als schwächere.

Eine Verzweigungsweise mit vielen Stufen und nicht sehr hoher Verzweigungsordnung fördert ganz besonders die Gleichmäßigkeit der Korngewichte.

4. Mit Zunahme der Korngewichte nimmt im großen ganzen der Spelzengehalt ab. Deshalb sinkt auch der Spelzengehalt der Körner in der ganzen Rispe und deren einzelnen Zweigen im allgemeinen von unten nach oben.

5. Die im morphologischen Aufbau voneinander abweichenden Rispen Typen sind in dem Grade der Gleichmäßigkeit der einzelnen Körner hinsichtlich der Gewichte und Spelzengehalte wesentlich voneinander abweichend, was aus den mittleren Gewichten und Spelzengehalten der Körner einer Rispe nicht erkannt werden kann. Als Typen mit den verhältnismäßig gleichmäßigsten Qualitäten in Bezug auf Korngewicht und Spelzengehalt haben sich jene ergeben, welche sich aus einer möglichst großen Zahl starker Äste mit möglichst vielen Stufen zusammensetzen. Die Verzweigungen aus den einzelnen Stufen sollen nicht zu hoher Ordnung sein, und namentlich sind sehr reichzählige, basale Widel nicht erwünscht.

Das Untersuchungsmaterial gibt über die Fragen hinaus, welche zunächst zu bearbeiten waren, eine Reihe von Aufschlüssen über verschiedene Punkte, von denen hier nur die folgenden in kurzer Ausführung hervorgehoben werden mögen. Nähere Mitteilungen hierüber an anderer Stelle werden vorbehalten.

1. Der Produktionswert der Rispe hängt natürlich an erster Stelle von der Größe des Ährchenbesatzes beziehungsweise Körnerbesatzes und von dem Gewichte der Körner überhaupt ab.

Für die Produktivität mit Bezug auf Ährchenansatz und Korngewicht gilt vor allem, daß die Äste gehörig stark sein sollen, weil stärkere Äste mehr Körner erzeugen, nämlich eine größere Anzahl von Zweigen hervorbringen. Nimmt die Zweigbildung in der Weise zu, daß die Zahl der Zweige niederer Ordnung sich vergrößert, nicht aber die Höhe der Ordnung ansteigt (vergleiche Seite 20, 22), so werden die Körner schwerer als im umgekehrten Fall, soweit nicht hierin das oben Seite 23 bezeichnete Verhältnis Verschiebungen hervorruft. Die Schlaffrispe steht in der Produktivität hinter der Steifrispe zurück und zwar vor allem deshalb, weil ihre Äste verhältnismäßig dünner

sind. Es können aber bei Rispen beliebiger Typen die Korn-
erträge entsprechend verschiedener Ausbildung der Stärke der Äste
schwanken.

Da eine höhere Internodien=(Stufen=)zahl im allgemeinen
einen reicheren Ährchenansatz ermöglicht, so erhöht sie auch das
Gewicht der Rispe. Aber auch in dieser Richtung gibt es viele
Ausnahmen.*)

2. Was das Verhältnis des Gesamtgewichts einer Rispe zur
Ährchenzahl, ferner das des Gewichts aller Außenkörner, sowie
sämtlicher Körner einer Rispe zur Körnerzahl betrifft, so stehen
Gewichte und Zahlen in direkter Beziehung; in dem untersuchten
Material fanden sich nur wenige Ausnahmen hievon vor.

Diese Ausnahmen kommen teils dadurch zustande, daß die
einzelnen Körner der einen Rispe schwerer sind als die der andern,
teils dadurch, daß die Verzweigung verschieden ist, wenn nämlich
die schwerere Rispe mit der geringeren Körnerzahl nicht so hohe
Verzweigungen hat, wie die Rispe mit mehr Körnern.

3. Frumwirth**) gibt an, daß das schwerste Korn eines
schwereren Fruchtstandes schwerer ist als das schwerste Korn eines
leichteren und diese Tatsache zeige sich übereinstimmend; nach
von Rümker steht die Korngröße mit der Größe des Fruchtstandes
in Korrelation.

Im großen ganzen haben auch nach meinen Befunden die
schwereren Fruchtstände die schwereren Körner, aber dies Verhält-
nis traf doch nicht immer zu.

Innerhalb der einzelnen Typen waren die schwereren Rispen
(mit Ausnahmen) die längeren.

*) Vergleiche von Seelhorst, Jahresbericht der Landwirtschaft,
XII. Jahrgang 1897.

**) Frumwirth, über den Sitz des schwersten Kornes in den Frucht-
ständen bei Getreide und in den Früchten der Hülsenfrüchte, Forschungen auf
dem Gebiete der Agrikulturphysik, Bd. 15.

I. Einzelfornungewichtsverteilung in den verschiedenen Ordnungen der Risse.

Erläuterungen für die Tabellen:

Sp = Spitze, Qu = Quirl, 0 = taubes Korn, f = bei der Ernte ausgefallenes Korn.

Die Quirle sind an der Risse von unten nach oben gezählt.

Die römischen Zahlen geben die verschiedenen Ordnungsgrade an.

M. K. G. = Mittleres Korngewicht, M. Sp. G. = Mittleres Spelzengewicht,

Sp. K. G. = Spitzen-Korngewicht, A. L. = Ählänge.

Die Zahlen geben die absoluten Gewichte in Zehntausendstel-Gramm.

1. Beseler Hafer.

Nr. 1 R 1							Nr. 1 R 2					
	I	II	III	IV	V	VI		I	II	III	IV	V
Sp	518						Sp	512				
Qu 7	544						Qu 6	554				
" 6	537	511					" 5	564	490			
" 5	532	544					" 4	545	f			
" 4	542	534					" 3	504	484	432		
		432	568						515			
" 3	526	530							488	470		
		517	500						541	490		
		566	519							434	430	
		0	462				" 2	0	508			
" 2	542	542							490	482		
		424	557						490	458		
		498	0	448						434	353	
			466	374					470	486		
			444							425	440	
		568	556							430	424	
			502	454	436						350	328
			542	0	400							322
				0	416		" 1	176	490			
				0	352				406	426		
" 1	524	492							496	0	376	
		442	408	382					455	394	0	
		474	449							435	356	
			430	390					450	444		
		478	454							423	375	
			418	430						0	0	
			416	384							406	
			477	314						453	350	
				390							374	
		520	450									
			460	0								
			362	385								
				378								
				408	380							
					339							
			430	422								
				406								
				416	346							
					350							

[illegible]

1. Befeler Hafer.

[illegible]

2. Strubes Hafer.

Nr. 2 R 2						Nr. 3						
	I	II	III	IV	V		I	II	III	IV	V	VI
Sp	506					Sp	553					
Qu 6	425	0				Qu 7	476	481				
" 5	496	450	395			" 6	466	0				
" 4	509	474				" 5	492	f	0			
		464	411	374		" 4	486	0				
" 3	480	462						0	450	0		
		438	411					0	0			
			409	289		" 3	f	484				
		0	414					488	394			
			423	306	333			492	0			
" 2	486	335	434						0	367		
		493	435	392				500	457			
		379	305						0	450		
			344	0					437	421		
			387			" 2	479	487		365	379	
		464	0					467	473			
			418	0				0	0			
				0					0	320		
			426	0				470	468			
				0					0			
" 1	454	431							0	420		
		386	0							391		
		441	396							0		
			394	338				498	0			
		414	0	358					412	446		
				331					0	380		
		332	358							0	366	286
			330						400	378		
			325							278		
		441	0							398	348	
			398	404		" 1	494	474				
			0	354				415	425			
				376				432	0			
			380	392					402	0		
				0				455	432			
				339					433			
		334	334						391	370	0	
			330					440	390			
			332						427	0	337	
									346	300		
									0	0		
										0	0	
								457	429			
									0			
									372	338		
										387	316	
									354	338		
										372	0	
									410	0		
										367	270	
										336	359	

3. Pfiffelbacher Hafer.

Nr. 4.						Nr. 5.					
	I	II	III	IV	V		I	II	III	IV	V
Sp	470					Sp	491				
Qu 7	438					Qu 6	424	451			
" 6	438	439				" 5	374	0			
" 5	428	448				" 4	464	450			
		431	412					0	0		
" 4	451	446	416			" 3	448	460			
		442	418	369				0	420	380	
" 3	438	422						0	408	360	
		412							0	0	
		431	424	382		" 2	444	438			
		424	447					442	381	0	
			450	0	304			454	358		
" 2	440	432							344	264	
		450	0	304				272	401		
		424	0						368	372	
			321						405	348	
		446	440							330	
			386	342		" 1	442	413			
			402	291				397	309		
" 1	428			320				0	304		
		386							358		
		322	366					384	365		
		388							330	290	
		392	336						283		
		316	353						286	342	
			340							315	0
			376	267				416	410		
									0	312	
									391	352	
										308	
										325	
									346	318	
										375	
										0	

4. Gritlinghafer.

Nr. 1 R 1						Nr. 1 R 2					
	I	II	III	IV	V		I	II	III	IV	V
Sp	0					Sp	0				
Qu 6	0					Qu 6	430				
" 5	0	0				" 5	400	0			
" 4	0	508				" 4	405	395			
		522	450	0				0	236		
" 3	517	0				" 3	0	0			
		535	440	0				377	248		
		452	0	420	0			0	272		
" 2	500	0							325	284	213
		447	420	200		" 2	368	358			
		461	406	0				334	338		
			407	396	344			346	274		
		0	481						288	0	220
			392	0	0			0	309		
			0	279	0				0	0	
				343	357				0	260	
					0					248	
" 1	484	435	277			" 1	361	263			
		465	0	357				310	261		
		469	402	0				301	0		
			398	372	0				280	253	
		387	354	344				0	0		
			240	303					235		
			297	0					290	232	
				0	252			319	280		
				263	250				275	0	
		380	0						223		
			414	388	0				267	0	
			0	382						0	
				382	298					0	
			287	0						0	
				352							
				0	0						
				0	0						
					239						

4. Svitlinghafer.

Nr. 2 R 1						Nr. 2 R 2					Nr. 3						
	I	II	III	IV	V		I	II	III	IV		I	II	III	IV	V	VI
Sp	517					Sp	518				Sp	544					
Qu 6	468					Qu 6	516				Qu 6	509					
" 5	0	0				" 5	475	477			" 5	508	524				
" 4	494	512				" 4	0	480			" 4	526	506				
		500	504					466	376				0	0			
" 3	482	470				" 3	476	446			" 3	515	0				
		449	472	445				458	419	381			475	485			
		0	480					392	438				0	0			
			429	404	410				393	390				492	424		
" 2	141	508				" 2	457	438			" 2	508	483				
		0	0	409				435	434				447	460			
		497	438	434				434	410				476	424			
			395	338					0	262						400	347
				400	365			410	454				519	0			
		344	454	423					394	340				410	408	345	
			242	331	352				355	352				0	407	358	
			0	297	353					0					0	0	
				405	355	" 1	424	0			" 1	0	0			346	326
" 1	0	430	279					407	394				478	422			
		456	423	356				392	364				456	369			
		463	418						0	380				404	0		
			422	352						0				404			
		400	360					360	260	264			452	390			
			373	361					348					369			
			358						375					420	337	332	
			391	352											0		
				354									478	416			
				324										423	352		
		0	438											337	376		
			435	414											335		
			278	360	300										384	0	
			386	0											423	344	0
				0												370	316
				0	256											351	326
		426	420														0
				386	362												
				352	304												
				333	319												

5. Svalöfs Goldregenhäfer.

Nr. 1						Nr. 2					Nr. 3				
	I	II	III	IV	V		I	II	III	IV		I	II	III	IV
Sp	208					Sp	394				Sp	436			
Qu 7	332					Qu 8	306				Qu 7	400	282		
" 6	380	314				" 7	376	348			" 6	378	402		
" 5	380	378				" 6	386	401			" 5	418	412		
		381	349			" 5	292	365					367	373	
" 4	372	367				" 4	382	354			" 4	409	412		
		400	348				402	274					415	374	
		382	340	320				387	364				415	400	
" 3	371	368						406	362					408	350
		394	352						362	0	" 3	374	399		
		387	330	317		" 3	399	0					382	0	
		384	358	340				364	365				411	370	
			0	330	f			370	364					372	345
" 2	334	369						335	280				404	0	
		0	347					350	354					0	324
		380	360	302					353	314				384	352
		358	328						364	318					316
			323	304		" 2	377	368			" 2	409	208		
			344	260				371	350				404	0	
				282									0	0	
		351	337	300				379	356					351	326
			322	247					0	292			405	359	
				272				346	322					357	
			340	298					300	254				354	
				292					330	286			370	326	
				292						240				359	0
" 1	354	351						374	354					0	264
		360	304						359	298					302
		370	323						342	301				344	296
			325	276						241					0
		334	307						344	300					294
			304	222						298	" 1	397	365		
			276							298			353	311	
			296			" 1	334	318					356	304	
	345	298						332	291					280	
		308	172					325	235				380	317	
		338	244						308					274	
		314	308					325	236				0	286	
			262						309					220	
			282					316	308				362	301	
			294						290					335	316
									234					330	280
									238					318	
								361	311						
									306						
									339	233					
									0	140					
									297	243					
										232					

7. Sigomohäfer.

Nr. 1 R 1							Nr. 1 R 2					
	I	II	III	IV	V	VI		I	II	III	IV	V
Sp	571						Sp	483				
Qu 7	560						Qu 6	457				
" 6	589						" 5	282	474			
" 5	537	560					" 4	518	510			
" 4	600	563					" 3	494	494	430		
		544	557						445	436		
" 3	355	348								430	428	
		515	f				" 2	515	492			
		Nst II fehlt							450	419		
			490	496						420	334	
" 2	562	534							536	450	408	
		514	514							440	426	
		544	523								370	384
			508	474	425		" 1	494	496			
			502	499					448	374	372	
		539	476	499					414	410		
				485	420	450				382	329	
" 1	518	484	477							407	266	
		495	474	438							338	
		483	487						461	415	376	
			449	448	397					397	373	
			459	380							347	320
				422	400	382					346	325
		450	480									317
			438	452						0	371	
			428	404							350	337
				0	396	376						
			417	396								
				440	372							
				0	418							
					395	363						

	376	328
390	377	
	389	333
	361	

8. Deutewiher Gafer.

Nr. 1 R 1						Nr. 1 R 2					
	I	II	III	IV	V		I	II	III	IV	V
Sp	430					Sp	383				
Qu 7	416					Qu 6	367	357			
" 6	282	400				" 5	376	344	328		
" 5	404	389				" 4	381	0			
		395				" 4		395	316		
" 4	381	352	351			" 3	357	370			
		388	344	0				372	342		
		384	360					392	371		
			371	340					320	275	240
" 3	398	388				" 2	356	344			
		381	292	312				327	331		
		356	307					325	322		
			358	339					278		
		408	345	338				358	354		
			327	354					324	266	
			396	366					292		
				348	330	" 1	370	340			
" 2	400	395						351	290		
		385	372					342	288		
		385	381						292		
			328	327				324	280	204	
		360	352						947		
			0						268		
			332	320				345	311		
				284	253				308	263	
		406	376						284		
			378	350					300	248	
			338	330						234	
				338	310						
			354	333							
				330							
				286	281						
					256						
" 1	368	362									
		346	330								
		366	305								
			294	280							
		361	0								
		344	306								
			297								
			289								
		376	335								
			360	0							
			313	296							
				268							
			285								
			315	293							
				322	268						

8. Leutewitzer Hafer.

Nr. 1 R 3						Nr. 2 R 1					
	I	II	III	IV	V		I	II	III	IV	V
Sp	329					Sp	322				
Qu 6	365	368				Qu 7	374				
" 5	412	395	367			" 6	278	337			
" 4	388	f	366			" 5	308	372			
		383	367	326				337	350		
" 3	424	398				" 4	355	316			
		406	360	333				373			
		410	386					356	342		
			366	337	303			381	f	324	
" 2	416	383	352			" 3	392	346			
		387	395					362	346		
		378	203					308	330		
			298	263					0	258	
			312	288				406	380		
		391	378						378	342	
			378	329					0	352	
			387	336						326	288
" 1	407	385				" 2	391	381	347		
		374	308	256				0	314		
		366	320	291				360	336		
			311						326		
		346	336						309		
			332					372	331		
			312						349	308	
		365	336						303		
			349	308					355	310	
			204	340						296	
				330	297					240	
						" 1	0	0			
								278	322		
								325	323		
								357	345		
									328		
								0	0		
									300		
									310		
								327	323		
									315		
									275		

[illegible]

9. Duppauer Gafer.

Nr. 1 R 1						Nr. 1 R 2					
	I	II	III	IV	V		I	II	III	IV	V
Sp	557					Sp	522				
Qu. 6	514					Qu 7	514				
" 5	521	521				" 6	0				
" 4	530	534				" 5	515	487			
		515	520			" 4	516	515			
" 3	500	501				" 3	467	516	493		
		458	508			" 3	467	0			
" 2	493	480	492	447		" 3	490	461			
		507				" 3	493	497			
		482	481			" 2	512	494		444	
		507	478			" 2	482	472			
		482	447	402	0	" 2	376	450			
			490	460		" 2		417		315	
			483	464		" 2		442			
			0	464		" 2		449		0	
				439	360	" 2		470		432	
" 1	470	404				" 1	476	448		416	393
		446	431			" 1	476	448			
		468	0			" 1	476	415	390		
			438	420		" 1	476	0	242		
		474	446			" 1	476	297	382		
			440	378		" 1	476		228		
			413	0	345	" 1	476		388	0	
				366		" 1	476		f	288	
		473	412			" 1	476		0	290	
			440	390		" 1	476			254	
			442	387		" 1	476				
				435	358	" 1	476				
			442	366	334	" 1	476				
				374	346	" 1	476				
				0	373	" 1	476				
					0	" 1	476				

[illegible]

10. N H 3.

Nr. 1 R 1						Nr. 1 R 2					
	I	II	III	IV	V		I	II	III	IV	V
Sp	373					Sp	391				
Qu 6	373					Qu 5	365				
" 5	365	348				" 4	342	346	296		
" 4	325	332				" 3	352	340			
		321	264					350	318	289	
" 3	364	308				" 2	329	311			
		310	283					228	188	213	
		320	318	297				310	296		
" 2	338	290	276						277	200	134
		295	278			" 1	334	290			
			284	236	202			277	292		
			293	250				268	242		
			282	255					0		
				260	234			302	0		
" 1	308	288	243						206	180	
		272	0						250	190	
		247	0							145	
			212								
			213	185							
				180							
		300	284								
			204	184							
			260	0	173						
			242	221							
				194	137						
				223	168						

10. N H 3.

Nr. 2 R 1							Nr. 2 R 2						
	I	II	III	IV	V	VI		I	II	III	IV	V	VI
Sp	f						Sp	414					
Qu 6	f						Qu 6	386					
" 5	f	f					" 5	384	383				
" 4	405	f					" 4	300	362				
		382	368					366	370				
" 3	405	392	375				" 3	410	f				
		397	361					f	370				
			366	327				410	334				
" 2	406	362	360						370	374			
		363	388				" 2	373	335				
			370	360	348			340	366				
		406	382					388	389				
			0	350					352	306	254		
			378	f				368	305				
				356	365				352	304			
" 1	406	367	324						370	348	335		
		381	348				" 1	408	375				
		406	371						360	342	288		
			358	290					348	316			
			352	370						346	250		
				260	0	295				327	321		
		405	347								0	324	
			356	318	329				406	354			
			363	340						342	300	342	
				338	335					372	319	340	
				340	352						0	304	
					330	334						265	254

11. S H 2.

Nr. 1 R 1						Nr. 1 R 2					
	I	II	III	IV	V		I	II	III	IV	V
Sp	374					Sp	330				
Qu 6	368					Qu 7	321				
" 5	375	350				" 6	348				
" 4	350	277				" 5	0	314			
		346	337			" 4	0	344			
" 3	349	348				" 3	272	346	331		
		320	321			" 2	334	312	297		
		342	322					326	288	270	
			0	304		" 2		321	231	256	
" 2	327	328						284	293		
		304	0						264	245	
		322	300							258	231
			302	272		" 1	300	f			
		318	294					259	258		
			308	312				282	200		
			324	298	300				260		
" 1	333	317						276	300		
		302	280						292	256	
		322	302							257	
			284	245						0	
			281	254					230		
				281	271						
		330	293	304							
			327	264	279						
				300	256						
			330	302	286						

11. S H 2.

Nr. 1 R 3					Nr. 2 R 1						
	I	II	III	IV		I	II	III	IV	V	VI
Sp	312				Sp	f					
Qu 5	286				Qu 6	f					
" 4	286	291			" 5	352	377				
" 3	304	294	278		" 4	402	376				
" 2	314	262	230		" 3		0	312			
		260	240	228	" 3	386	320				
" 1	0	0					362	325			
		266	212				372	341			
		234	241	216				308	322		
			0	167	" 2		Ast I.	Ordnung	fehlt		
							324	322			
								300	223	274	
							343	334			
								344	288		
								326	295		
					" 1	376		302	266		
							334				
							315	308			
							Ast II.	Ordnung	fehlt		
								320	288		
									285	285	
							318	300	292		
								315	308	258	
									310	298	266
								276	0	295	

11. S H 2.

Nr. 2 R 2							Nr. 3							
	I	II	III	IV	V	VI		I	II	III	IV	V	VI	VII
Sp	332						Sp	400						
Qu 6	303	292					Qu 6	402						
" 5	329	f	262				" 5	369	377					
" 4	298	292	276				" 4	377	352					
		279							410	356				
" 3	313	298					" 3	394	394					
		311	278						358	350				
		314	0						371	370				
			272	296						276	328			
" 2	300	292					" 2	324	367					
		270	280						368	368				
		270	265						359	386				
			258	226						362	0	300		
		267	296	278					276	359				
			302	281	230					363	360			
" 1	286	287								367	351	289		
		256	270								367	310	285	
		283	255				" 1	397	350	315				
			230	252					322	330	327			
			247	227					333	347				
				216	194					330	332			
			186	236	220					358	288			
				245	0	172					286	300	290	
			280	259	250				322	348				
										355	340			
										352	315			
											290	302	300	
										350	286			
											330	265		
											f	350		
												0	320	282

12. Stughafer.

Nr. 1 R 1							Nr. 1 R 2				
	I	II	III	IV	V	VI		I	II	III	IV
Sp	406						Sp	370			
Qu 6	390						Qu 6	320			
" 5	388	0					" 5	340	324		
" 4	386	0					" 4	0	321		
		390	371				" 4		313	261	
" 3	0	370					" 3	317	307		
		376	351	335			" 3		295	0	
		382	f				" 3		152	310	
			350	355			" 3			262	247
" 2	390	370					" 2	305	0		
		384	370				" 2		300	0	
		372	350				" 2		256	231	
			352	332	289		" 2		308	284	
		403	380				" 2			276	245
			358	335			" 2			175	248
			257	352			" 2				222
				326	280	0	" 1	314	293		
" 1	379	344					" 1		278	238	
		361	342				" 1		292	262	
		356	300				" 1		300	269	
			346	284			" 1			244	
		0	281				" 1			218	
			325	292	223		" 1		298	188	
			345	283	264		" 1			193	
				278	264		" 1			256	
					148		" 1			218	
		354	353				" 1				
			342	294			" 1				
			338	314			" 1				
				309	300		" 1				
			347	173			" 1				
				170	248		" 1				
				298	225		" 1				
					235		" 1				

12. Stuhlfäher.

Nr. 1 R 3					Nr. 2 R 1						
	I	II	III	IV		I	II	III	IV	V	VI
Sp	353				Sp	384					
Qu 6	383				Qu 6	0					
" 5	372	318			" 5	368	369				
" 4	344	323			" 4	384	356				
		280	300		" 4		372	366			
" 3	349	314			" 3	394	344				
		330	294				385	331			
		335	275				360	336			
		0	270					361	336		
" 2	344	312			" 2	361	340				
		308	288				364	333			
		278	261				352	320			
		305	235					302	304		
			280	240			370	352			
			300	234				320	300		
				244				320	314		
" 1	0	256			" 1	362	334		298	301	
		294	240				341	319			
		270	129				339	328	300		
			272	250			362	330			
		274	277					323	327	256	
			0					325	273	252	
		266	153						292	244	
			293							218	236
			288	240			340	328			
			174					252	313		
			0	238				330	272		
									271	270	236
									270	286	246
								284	305		
									286	284	270

[illegible]

13. F H 5.

Nr. 1 R 1						Nr. 1 R 2				
	I	II	III	IV	V		I	II	III	IV
Sp	f					Sp	f			
Qu 7	392					Qu 6	338	288		
" 6	325	372				" 5	331	292	0	
" 5	f	326				" 4	335	342		
		372	300					311	f	
" 4	233	378				" 3	342	334		
		f						290	300	
		f	f	f				335	335	
" 3		Nst I. Ordnung fehlt				" 2	300	315	f	172
		368	f	295				f	264	
		367	329	322				278	223	
			350	306	273			287	314	
" 2	f	354	308						249	216
		355	330						270	234
			313	332						
		334	322			" 1	284	266		
			310	278				302		
			330	0				239	174	
				0				130	192	
" 1	359	332							170	
		315	240					357	300	
		325	246						195	f
			200						180	0
		290	238							
			216							
			187							

13. F H 5.

Nr. 2 R 1							Nr. 2 R 2					
	I	II	III	IV	V	VI		I	II	III	IV	V
Sp Qu 7	f 288						Sp Qu 6	f 370	345			
" 6	367	382					" 5	390	344	336		
" 5	328	384					" 4	394	393			
		389	360				" 3	f	398	360		
" 4	362	383					" 3	f	410			
		322	341				" 3		320	384		
		398	341				" 3		0	376		
			352	306			" 2	377	338	362	332	
" 3		Ast I. Ordnung fehlt					" 2		363	266		
		328	361	297			" 2		f	315		
		360	332				" 2			311	240	
			358	317			" 2		180	326		
				264	252		" 2			349	273	
" 2	352	381					" 2			0	282	
		346	354				" 2				0	238
		319	314	233			" 1	376	355			
		0	345	300	206		" 1		295	310		
			354				" 1		317	268		
			357	0			" 1			256		
			366	336			" 1			320		
				346	305	266	" 1			324		
" 1		Ast I. Ordnung fehlt					" 1		354	293	238	
		f	313				" 1				272	
			200	290			" 1				240	
			320	233			" 1					
				198			" 1					
		260	298	310			" 1					
			0	292	259		" 1					
				240	238		" 1					
					196		" 1					
			142	f	f		" 1					

13. F H 5.

Nr. 3							Nr. 4						
	I	II	III	IV	V	VI		I	II	III	IV	V	VI
Sp	388						Sp	0					
Qu 7	364						Qu 7	368					
" 6	376	361					" 6	f	370				
" 5	402	352					" 5	404	382				
		378	375				"		385	f			
" 4	f	390					" 4	382	382				
		342	390						382	380			
		360	364						396	364	344		
			f	353			" 3	Nst I. Ordnung					fehlt
" 3	Nst I. Ordnung					fehlt		363	345	306			
		358	329					386	362	340			
			363	329					370	353	338		
		354	324				" 2	384	385				
			360	341					f	362			
			345	275	f			214	343	332			
" 2	341	376							360	300	312		
		371	0					385	388				
		342	323	288					343	356			
			324	254						331	326		
				181	246				348	317	0		
		377	380				" 1	340	372				
			373	284	280				344	302			
				0	270	200			361	322			
			311	239	286					252	250		
" 1	282	360								354	332		
		363	294								326	318	
		0	312						321	338			
			297	297						325	308		
		356	321	264						356	354		
			329	294	151						327	f	230
			332	241	206					342	308		
				213							264	190	
		328	262										
			322	302									
			328	272									
				281	240								
				300	160								
					214	200							
			346	234	224								
				293	132								

II. Mittleres Korngewicht in den verschiedenen Ordnungen und in den einzelnen Quirlen der Ripse. 1. Befeler.

											M.K.G. i. Quirl	
											abf.	%
I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	
Gr. 1 R 1												
Qu 7	544					103	106				Spige	518 124
" 6	537					102	106					544 130
" 5	532					101	115					524 125
" 4	542					103						538 129
" 3	537					100	111					517 124
" 2	526		462			100	118		117		87	517 124
" 1	542		430	417		103	105	120	109	127	77	517 124
"	524		392	327	352	100	100	100	100	100	62	473 114
"												418 100
Gr. 1 R 2												
Qu 6	554					116	107				Spige	512 121
" 5	564					119	107					554 131
" 4	545					114	105	101				527 125
" 3	504		430			106	112	109	115		79	487 115
" 2	0		325			0	107	105	105	85		484 115
" 1	476		373			100	100	100	100	—	90	530 126
"										78		421 100
Gr. 1 R 3												
Qu 6	0					0	0				Spige	570 135
" 5	544					104	0	126				0
" 4	540					0	111	124				544 129
" 3	620		457			118	110	124	112		81	531 126
" 2	536		441	354	305	102	104	116	108	104	66	522 124
" 1	524		409	341		100	100	100	100	100	65	456 108
"												422 100

Strubes Gafer.

	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	V	VI	M.K.G. t. Quint
Str. 1 R 1															
Qu 7	0	374	418	390				103	108					Epige	536
" 6	446	444	0					109	0						0
" 5	488	457	386	326				112	107						394
" 4	476	400	386					98	107				67		445
" 3	430	430	351	358				106	97				83		414
" 2	0	407	362					100	100						421
" 1															392
															384
Str. 1 R 2															
Qu 7	476	481	432	204			98	114	114					Epige	486
" 6	464	452	453	410			96	108	119	61					476
" 5	460	460	453	389	327		95	110	116	123			44		472
" 4	485	460	447	389	327		100	119	116	94			85		387
" 3	0	457	447	389	327		0	109	118	116	94				452
" 2	470	456	422	356	323		97	109	111	107	93		68		405
" 1	484	420	379	434	347		100	100	100	100	100		72		405
															393
Str. 1 R 3															
Qu 6	0	0	340	0			0	0	106					Epige	476
" 5	0	426	397				0	109	123						0
" 4	458	397	366	322			104	101	114	114			0		340
" 3	0	397	355	324			0	105	111	115					427
" 2	375	410	392	281			85	100	100	100			86		362
" 1	440	392	321				100	100	100	100			64		366
"															357

Mr. 2 R 1

Qu 7	0	448	0	0	93	0	100	127	86	0	Spige	267
" 6	448	370	470	77	98	104	104	100	100	100		0
" 5	370	497	495	104	104	107	107	100	86	100		448
" 4	497	0	469	0	98	105	109	100	—	100		420
" 3	0	508	479	106	100	108	106	100	85	100	68	474
" 2	479	479	478	100	100	100	100	100	83	100	78	432
" 1	479											432

Mr. 2 R 2

Qu 6	425	0	496	450	93	0	109	91	79	100	Spige	506
" 5	496	496	469	411	109	110	109	100	81	100		425
" 4	509	480	450	414	112	115	113	100	86	100	69	447
" 3	480	486	418	393	106	110	114	100	81	100	68	441
" 2	486	407	364	392	107	102	108	86	80	100		395
" 1	454			353	100	100	100	89	78	100		404

Mr. 3

Qu 7	476	481	0	0	96	108	100	101	0	100	Spige	553
" 6	466	0	f	447	94	0	f	—	92	—		478
" 5	492	0	0	429	99	0	113	0	0	100	77	466
" 4	486	0	491	438	98	110	108	114	—	100	—	492
" 3	f	480	480	376	f	108	110	107	91	100	74	436
" 2	479	445	397	351	97	108	100	100	80	90	59	425
" 1	494				100	100	100	100	71	100	65	412
												401

Spiffelbacher:

	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	M.K.G. i. Dutrl		I	II	III	IV	V	M.K.G. i. Dutrl	
Str. 1 R 1																			
Qu 6	334	398	420	382	299	75	97	123	128	111	100	442	Str. 3	470	454	439	407	355	467
5	415	0	428	416	382	94	103	123	128	111	100	334	Qu 6	464	476	481	407	355	470
"	422	420	378	331	299	0	97	103	122	111	100	406	5	464	439	431	385	351	459
4	0	410	341	299	100	97	103	122	128	111	100	421	"	464	431	415	385	425	
"	420	410	341	299	100	95	100	111	111	100	100	385	3	440	427	415	385	405	
2	420	410	341	299	100	100	100	100	100	100	100	378	"	432	437	415	385	399	
"	443	410	341	299	100	100	100	100	100	100	100	373	2	442	413	390	351		
1	443	410	341	299	100	100	100	100	100	100	100	373	1	442	413	390	351		
Str. 2 R 1																			
Qu 7	0	434	0	374	327	117	119	151	142	135	100	371	Str. 4	438	439	412	369	304	470
6	458	0	394	374	327	117	119	151	142	135	100	446	Qu 7	438	439	412	369	304	438
"	448	0	394	374	327	117	119	151	142	135	100	448	6	438	439	412	369	304	438
5	430	427	387	343	327	115	117	138	142	135	100	406	5	428	439	412	369	304	438
4	479	451	387	343	327	115	117	138	142	135	100	406	"	451	444	417	382	304	426
"	431	321	376	335	327	121	117	138	142	135	100	397	4	438	422	440	382	304	420
3	431	321	376	335	327	86	114	135	142	135	100	366	"	440	438	387	318	304	397
2	431	321	376	335	327	100	100	100	100	100	100	295	3	440	438	387	318	304	396
"	0	371	330	248	230	100	100	100	100	100	100	295	2	440	438	387	318	304	396
1	0	371	330	248	230	100	100	100	100	100	100	295	1	428	361	354	267	304	252
Str. 2 R 2																			
Qu 6	412	413	415	256	263	100	109	125	97	125	100	443	Str. 5	424	451	0	370	326	491
5	431	399	415	256	263	105	109	125	97	125	100	412	Qu 6	374	0	370	326	326	437
"	420	378	388	256	263	102	106	117	97	125	100	422	5	464	450	0	370	326	374
4	0	378	388	256	263	102	106	117	97	125	100	411	"	450	0	370	326	326	374
3	0	378	388	256	263	101	107	112	97	125	100	341	4	448	460	414	370	326	457
"	405	401	372	330	263	98	107	112	97	125	100	377	"	444	401	376	328	326	423
2	412	376	331	263	263	100	100	100	100	100	100	345	2	442	402	338	326	326	387
"	412	376	331	263	263	100	100	100	100	100	100	345	1	442	402	338	326	326	377

	I	II	III	IV	V	M. K. G. t. Quintl		I	II	III	IV	V	VI	M. K. G. t. Quintl
Pr. 1 R 1							Pr. 2 R 2							
Qu 6	0	0				0	Qu 6	516	477					518
" 5	0	0				0	" 5	475	473					516
" 4	0	515	450	0		482	" 4	0	432	376				476
" 3	517	543	440	420	0	480	" 3	476	429	417	385			474
" 2	500	454	421	304	350	406	" 2	457	386	409	318			427
" 1	484	427	334	338	259	460	" 1	424		354	264			403
														357
Pr. 1 R 2							Pr. 3							
Qu 6	430	0				0	Qu 6	509	524					544
" 5	400					430	" 5	508	506					509
" 4	405	395	236			345	" 4	526	475	0				516
" 3	0	377	282	284	213	289	" 3	515	481	488	424			516
" 2	368	346	302	254	242	317	" 2	508	466	431	405	349		475
" 1	361	273	298	264	242	287	" 1	0		397	356	328		417
														387
Pr. 2 R 1														
Qu 6	468					517								
" 5	0	0				468								
" 4	494	506	504			0								
" 3	482	459	460	424	410	501								
" 2	441	449	382	379	356	447								
" 1	0	437	384	364	308	401								
						373								

Snalöfs Goldregen.

	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	M.K.G. t.	Quirl
Str. 1																	
Qu 7	332	314				94					100					208	
" 6	380	379				107	89				100	83				332	
" 5	372	383	349			107	108	113			100	99				347	
" 4	371	383	346	320		105	109	112	125		100	103				369	
" 3	334	364	338	329	f	105	109	112	128		100	103				355	
" 2	354	352	308	285	200	94	103	109	111		100	109				357	
" 1				257		100	100	100	100		100	99				304	
																318	
Str. 2																	
Qu 8	306	348				92					100					394	
" 7	376	401				112	106				100	93				306	
" 6	386	401				115	122				100	104				362	
" 5	292	373	354			87	113	124			100	127				393	
" 4	402	356	363	0		120	108	128	0		100	88				339	
" 3	399	361	356	305		119	109	125	114		100	90				374	
" 2	377	367	339	281		113	112	119	132		100	97				365	
" 1	334	329	285	212		100	100	100	100		100	99				341	
																290	
Str. 3																	
Qu 7	400	282				111	77				100	70				436	
" 6	378	402				95	109				100	106				341	
" 5	418	389	373			105	106	125			100	93				390	
" 4	409	414	394	350		103	113	132	117		100	101				393	
" 3	374	399	375	334		95	109	126	112		100	106				392	
" 2	409	347	350	296		103	95	117	99		100	85				370	
" 1	397	367	298	298		100	100	100	100		100	92				350	
																340	

Q _u	7	359	345	313	272	89	94	100	96	Spitze	426
"	6	408	362	382	102	102	98	100	89		352
"	5	400	403		100	100	109	100	101		385
"	4	390	385	349	97	104	108	100	99	95	395
"	4	400	385	349	93	107	117	100	106	80	359
"	3	373	395	378	272	106	105	100	101	73	353
"	2	398	390	341	225	99	106	100	98	56	329
"	1	400	369	262	100	100	100	100	92	65	389

Fr. 5	Qu	7	395	406	106	118	100	103	Spige	343
"	6	254	395		68	115	100	155		400
"	5	404	387		109	113	100	96		324
"	4	380	383		102	112	100	101	80	370
"	3	390	386	334	105	113	159	99	88	360
"	2	353	365	338	95	107	159	100	86	361
"	1	372	343	301	100	100	141	103	85	336
				213			100	92	57	304
				289				78		

[illegible]

Sortlösa.

						M.K.G. t. Durtl						M.K.G. t. Durtl					
						I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI
Mr. 1 R 1																	
Qu						Spibe						f					
7	394					107	101					95	105				430
6	0	460				0	101					107	0	112			435
5	0	318	453			0	70	101				97	101	131			429
4	444	441	358	466		120	97	79	139			100	107	127	131	—	422
3	440	466	144	316	406	119	112	99	94	—		102	102	114	106		400
2	496	488	442	396		134	107	98	118			100	100	100	100		379
1	369	455	448	335		100	100	100	100								
Mr. 2																	
Qu						Spibe						Spibe					
6	446	460				127	107					109					364
5	330	0	0			94	0	0				122	0				394
4	456	437	437			129	102	108				0	0				439
3	410	439	412	418	400	116	102	102	118	125		113	116	118			390
2	453	426	417	379	327	129	99	103	107	102	105	124	117	129	—		378
1	352	429	405	353	320	100	100	100	100	100	100	114	108	127	—		357
Mr. 3						Spibe						Spibe					
Qu						Spibe						Spibe					
7	500					105	93					100	100	100			488
6	478	414				100	93					100	100	100			500
5	137	465	292			92	104	68				92	104	68			446
4	0	461	496	0		0	104	116	0			0	104	116	0		398
3	469	464	480	452	0	98	104	112	113	0		478					478
2	506	485	473	401	318	106	109	111	100	99		437					466
1	477	445	428	399	323	100	100	100	100	100		414					437
Mr. 4						Spibe						Spibe					
Qu						Spibe						Spibe					
6	412	448				95	105					95	105				430
5	465	0	406			107	0	112				97	0	112			435
4	421	428	437			97	101	131				100	107	127	131	—	429
3	437	453	423	425	374	100	107	127	131	—		100	107	127	131	—	422
2	445	435	379	342		102	102	114	106			102	102	114	106		400
1	435	425	333	342		100	100	100	100			100	100	100	100		379
Mr. 5						Spibe						Spibe					
Qu						Spibe						Spibe					
8	394					109						109					364
7	439	0				122	0					122	0				394
6	0	0				0	0					0	0				439
5	407	428	336			113	116	118				113	116	118			390
4	447	429	368	267		124	117	129				124	117	129			378
3	418	402	366	242		16	109	129				16	109	129			357
2	412	398	362	309		114	108	127	—			114	108	127	—		370
1	360	368	285			100	100	100				100	100	100			338

M.K.G. t. Quirl						M.K.G. t. Quirl					
I	II	III	IV	V		I	II	III	IV	V	VI
Nr. 1 R 1						Nr. 2 R 1					
Qu 6	390					Qu 6	0				Spige
" 5	388					" 5	368				384
" 4	386					" 4	384				0
" 3	0	371				" 3	394	366			368
" 2	390	351	345			" 2	361	343	336		371
" 1	379	314	336	284		" 1	362	324	304	301	359
		331	269	238		"		313	291	259	329
											302
Nr. 1 R 2						Nr. 2 R 2					
Qu 6	320					Qu 7	336				Spige
" 5	340					" 6	345				350
" 4	0					" 5	377				336
" 3	317	261				" 4	344	348			345
" 2	305	286	247			" 3	355	345			362
" 1	314	241	238			" 2	354	310	318	195	341
		232				" 1	f	330	277		321
								291	214		288
											255
Nr. 1 R 3						Nr. 3					
Qu 6	383					Qu 6	f				Spige
" 5	372					" 5	375				f
" 4	344					" 4	f				371
" 3	349	300				" 3	358	369			366
" 2	344	284	270			" 2	361	388	342		356
" 1	0	273	239			" 1	403	315	278	283	306
		228	242					334	316	274	319

Sigmo.

	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	V	VI	M.K.G. t. Quint
Pr. 1 R. 1															
Qu 7	560						108								571
" 6	589						114								560
" 5	537						104	117							589
" 4	600	560					116	116							549
" 3	555	553	490	496			107	111	107						576
" 2	562	533	505	489	422	450	108	111	111	116	106				518
" 1	518	478	456	422	396	374	100	100	100	100	100		75	80	493
"												120	76	72	441
Pr. 1 R. 2															
Qu 6	457	474					93								483
" 5	282	510					57	104							457
" 4	518	469	432	428			105	112							378
" 3	494	469	432	428			100	103	109	123					514
" 2	515	493	432	384	384		104	108	109	111	118		86		456
" 1	494	455	397	347	325		100	100	100	100	100		75		442
"													66		404
Pr. 1 R. 3															
Qu 5	548	537					107								600
" 4	546	545	428	433			107	119							548
" 3	518	545	428	433			107	120	107	134					541
" 2	462	532	451	353			90	117	113	109			79		488
" 1	512	453	399	322			100	100	100	100			76		449
"													63		421

	I	II	III	IV	V	VI	M.K.G. t.	Quirl
Nr. 1 R 1							f	
Qu 7	392						392	
" 6	325	372					348	
" 5	f	349	300				324	
" 4	233	378	f				305	
" 3	f	367	339	f			322	
" 2	f	348	319	308	273		339	
" 1	359	315	221	350			298	
Nr. 1 R 2							f	
Qu 6	388	288					313	
" 5	331	292					311	
" 4	335	326	0				330	
" 3	342	313	f				286	
" 2	300	293	317	172			270	
" 1	284	259	264	225			248	
Nr. 2 R 1							f	
Qu 7	288	382					288	
" 6	367	386					374	
" 5	328	368	360				358	
" 4	362	344	345	306			345	
" 3	f	344	350	293	252		309	
" 2	352	349	348	304	256	266	312	
" 1	f	260	255	260	231		251	

Suppauer.

										M. K. G. i. Dutrl						M. K. G. i. Dutrl					
										I II III IV V VI I II III IV V VI						I II III IV V VI					

M. K. G.						M. K. G.						M. K. G.					
t.						t.						t.					
Quint						Quint						Quint					
I	II	III	IV	V		I	II	III	IV	V		I	II	III	IV	V	
Mr. 1 R 1						Mr. 2 R 1						Mr. 3					
Qu 6	368					Qu 6	f					Qu 6	402				
" 5	375					" 5	352					" 5	369				
" 4	350	337				" 4	402					" 4	377	356			
" 3	349	321	304			" 3	386	312				" 3	381	332	328		
" 2	327	306	294			" 2	f	325	322	270		" 2	374	332	359	299	
" 1	333	297	278			" 1	376	304	296	284	266	" 1	342	367	310	304	
Mr. 1 R 2						Mr. 2 R 2						Mr. 3					
Qu 7	321					Qu 6	303					Qu 6	402				
" 6	348					" 5	329	292				" 5	369				
" 5	0					" 4	298	f				" 4	377	356			
" 4	0	314				" 3	313	298	262			" 3	394	332	328		
" 3	272	345	331			" 2	300	308	275	230		" 2	324	367	359	299	
" 2	334	320	292	270		" 1	286	275	280	221	172	" 1	397	343	310	304	
" 1	300	306	263	253				245	239								
Mr. 1 R 3						Mr. 2 R 3						Mr. 3					
Qu 5	286					Qu 6	312					Qu 6	402				
" 4	286					" 5	286					" 5	369				
" 3	304	291				" 4	288					" 4	377	356			
" 2	314	294	278			" 3	288					" 3	394	332	328		
" 1	0	261	235	228		" 2	259					" 2	324	367	359	299	
		250	226	191		" 1	333					" 1	397	343	310	304	

N H 3.

											M.K.G. i. Quirt	
											abf.	%
I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	

Gr. 1 R 1

Qu 6	373					121	126				100	373	166
"	365	348				86	118				131	373	166
"	4	325	264			105	113	111			100	366	158
"	3	364	300	297		118	113	127	150		86	310	138
"	2	338	303	282	218	109	109	119	126	137	82	314	139
"	1	308	277	198	159	100	100	100	100	100	74	273	121
											64	225	100
											52		

Gr. 1 R 2

Qu 5	365					109	122	119			101	391	158
"	4	342	296			102	121	129			100	365	147
"	3	352	318	289		105	121	129	168		100	328	132
"	2	329	254	205	134	99	99	103	119	41	82	329	133
"	1	334	247	172		100	100	100	100		62	255	103
											51	248	100

Gr. 2 R 1

Qu 6	f					f	f				f	f	
"	5	f				f	f				f	f	
"	4	405	368			99	98	105			94	385	111
"	3	405	367	327		99	101	104	102		97	375	108
"	2	406	377	355	356	100	97	107	110	106	93	371	107
"	1	406	389	322	336	100	100	100	100	100	96	347	100
					314							77	

Gr. 2 R 2	Qn	6	386	383	370	374	325	356	368	372	294	315	254	94	103	98	108	127	93	100	100	100	99	100	121	123	91	87	95	87	72	77	62	Spitze	414	125
	"	5	384	364	370									94	94	98	108					100	99	100	121	123	91	87	95	87	72	77	62	Spitze	386	117
	"	4	300	364	370	374								73	98	108						100	100	100	121	123	91	87	95	87	72	77	62	Spitze	383	116
	"	3	410	410	358									100	110	105	105					100	100	100	100	100	91	87	95	87	72	77	62	Spitze	349	106
	"	2	373	368	342	295	325	356	368	372	294	315	254	100	96	104	100	100	100	100	100	100	96	100	100	100	84	72	77	62	77	62	Spitze	378	114	
	"	1	408	372	342	295	325	356	368	372	294	315	254	100	100	100	100	100	100	100	100	91	100	100	100	84	72	77	62	77	62	Spitze	348	105		
	"																																	Spitze	330	100

[illegible]

Fr. 4	376	370		129	128																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</
-------	-----	-----	--	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

III. Verhältnis von Spitzentorngewicht zu mittlerem Störungsgewicht der einzelnen Stiffe und zu Stiffängen.

Befeler.

Quart	Stiffe	St. 1 — R 1			St. 1 — R 2			St. 1 — R 3		
		Sp. K. G.	M. K. G.	A. L.	Sp. K. G.	M. K. G.	A. L.	Sp. K. G.	M. K. G.	A. L.
I	1	524	443	142	476	445	128	524	459	119
	2	520	478	89	450	455	96	540	448	91
	3	430	419	67	453	435	81	448	407	76
	4	346	381	41	392	395	48	435	404	55
	5	350	350	32	392	395	48	376	376	53
II	1	542	516	29	0	493	102	326	326	30
	2	568	508	124	470	455	81	536	474	16
	3	498	473	81	490	471	61	556	495	94
	4	466	471	57	430	427	41	484	466	76
	5	444	420	34	434	434	24	447	447	55
III	1	0	444	36	350	353	33	354	354	31
	2	0	416	34	322	339	24	305	305	21
	3	352	352	22	322	322	18	354	354	11
	4	352	518	14	494	494	83	620	552	70
	5	526	512	89	504	515	61	548	532	57
IV	1	566	542	70	541	515	35	480	480	31
	2	0	0	39	434	434	23	457	457	18
	3	462	462	22	430	430	54	0	526	54
	4	542	538	56	545	545	32	513	513	30
	5	432	432	36	484	484	18	544	544	30
V	1	568	568	18	432	432	28	0	0	16
	2	532	532	32	564	564	12	0	0	10
	3	544	544	18	490	490	24	570	570	25
	4	537	537	23	554	554	16	0	0	10
	5	511	511	10	512	512	24	570	570	25
VI	1	511	511	20	512	512	24	570	570	25
	2	544	544	20	512	512	24	570	570	25
	3	518	518	20	512	512	24	570	570	25
	4	518	518	20	512	512	24	570	570	25
	5	518	518	20	512	512	24	570	570	25
VII	1	518	518	20	512	512	24	570	570	25
	2	518	518	20	512	512	24	570	570	25
	3	518	518	20	512	512	24	570	570	25
	4	518	518	20	512	512	24	570	570	25
	5	518	518	20	512	512	24	570	570	25
VIII	1	518	518	20	512	512	24	570	570	25
	2	518	518	20	512	512	24	570	570	25
	3	518	518	20	512	512	24	570	570	25
	4	518	518	20	512	512	24	570	570	25
	5	518	518	20	512	512	24	570	570	25

Quintl	Site	Gr. 2 — R 1			Gr. 2 — R 2			Gr. 3		
		Sp. K. G.	M. K. G.	A. L.	Sp. K. G.	M. K. G.	A. L.	Sp. K. G.	M. K. G.	A. L.
I	1	530	454	140	500	451	109	0	421	129
	2	484	438	111	424	424	68	457	377	107
	3	458	398	69	425	425	39	442	385	80
	3'	459	412	57	362	362	19	0	362	59
	4	353	353	35				364	364	43
II	5							494	514	29
	1	520	504	110	494	467	96	494	494	107
	2	530	461	85	480	442	71	523	494	85
	3	500	438	75	460	458	59	0	508	67
	3'	460	444	56	410	439	49	464	431	54
III	4	422	347	48	467	420	35	376	466	40
	4'	0	406	29		467	33	404	466	39
	5							372	404	27
	5'							382	382	18
	6							372	372	15
IV	1	0	468	80	546	483	84	518	487	79
	1	520	517	58	551	529	61	480	493	57
	2	505	442	31	384	384	33	514	514	32
	3				464	464	25	452	452	22
	4				0	546	59	0	485	54
V	1	540	516	57	0	0	36	526	526	34
	2	0	0	40	0	0	25	482	482	18
	3	0	0	19	428	428	10			
	4				0	0	32	500	500	29
	1	492	492	31	544	544	17	483	483	21
VI	2	514	514	21				478	478	12
	3	492	492	10				476	476	20
	1	511	511	12	496	496	23	448	448	11
	2				0	0	12	520	520	27
	1	522	522	10	510	510	9			
VIII	1	500	500	22	518	518	20			

N H 3.

Quint	Sfife	Pr. 1 R 1				Pr. 1 R 2			
		Sp. K. G.	M. K. G.	A. L.		Sp. K. G.	M. K. G.	A. L.	
I	1	308	278	115		334	298	100	
	2, 2'	300	243	94		302	268	72	
	3, 3', 3"	247	229	78		0	229	60	
	4, 4', 4"	242	199	45		250	255	24	
	5	180	180	22		145	145	18	
II	1	168	168	16					
	2, 2'	338	301	89		329	320	75	
	3, 3'	282	286	75		310	228	50	
	4, 4'	260	284	52		277	188	38	
	5, 5'	234	236	30		200	213	20	
III	1	202	202	14		134	134	8	
	2, 2'	364	336	65		352	346	58	
	3, 3'	320	310	41		350	350	31	
	4	283	283	28		318	318	23	
		297	297	14		289	289	10	
IV	1	325	328	51		342	342	30	
	2	321	321	26		346	346	19	
	3	264	264	11		296	296	10	
V	1	365	365	22		365	365	9	
	2	348	348	9		0	0		
VI	1	373	373	8		391	391	28	
VII	1	373	373	21					

Quirl	Stufe	Nr. 2 R 1			Nr. 2 R 2		
		Sp. K. G.	M. K. G.	A. L.	Sp. K. G.	M. K. G.	A. L.
I	1	406	365	126	408	355	124
	2, 2'	405	376	92	406	380	92
	3, 3'	363	344	74	372	343	64
	4, 4'	340	318	38	0	304	36
	5, 5'	330	0	23	265	324	21
	6, 6'	334	295	13	254	254	9
II	1	406	376	100	373	353	105
	2, 2'	406	379	92	368	332	79
	3, 3'	378	370	62	370	352	53
	4, 4'	356	360	32	348	306	30
	5, 5'	365	348	20	335	254	17
				15			11
III	1	405	405	53	410	410	68
	2, 2'	397	392	48	410	f	50
	3, 3'	366	375	27	370	370	29
	4	327	327	13	374	374	15
IV	1	405	405	41	300	331	44
	2	382	382	24	366	366	24
	3	368	368	11	370	370	10
V	1	f	f	19	384	384	21
	2	f	f	9	383	383	9
VI	1	f	f	—	386	386	7
VII	1	f	f	15	414	414	19

N H 3.

District	Office	Mr. 3			Mr. 4		
		Sp. K. G.	M. K. G.	A. L.	Sp. K. G.	M. K. G.	A. L.
I	1	408	351	128	290	284	140
	2, 2'	471	316	93	338	299	94
	3, 3'	348	305	100	235	274	94
	4, 4'	356	356	70	258	266	80
	5, 5'	316	316	51	300	290	59
II	1	230	285	18	276	293	67
	2, 2'	397	272	23	254	254	43
	3, 3'	0	230	10	186	265	26
	4, 4'	365	391	92	200	200	11
	5, 5'	360	373	108	360	342	111
III	1	384	381	92	322	301	94
	2, 2'	374	360	60	243	297	72
	3, 3'	384	325	42	314	381	64
	4, 4'	322	325	29	308	314	47
	5, 5'	380	338	16	275	278	36
IV	1	370	330	20	242	242	25
	2, 2'	356	378	74	350	357	11
	3, 3'	346	374	58	0	336	74
	4, 4'	358	384	42	336	345	57
	5, 5'	358	358	23	327	327	42
V	1	400	375	18	312	312	25
	2, 2'	400	375	51	0	359	21
	3, 3'	374	374	28	363	363	50
	4, 4'	413	413	13	350	350	30
	5, 5'	340	340	24	392	392	14
VI	1	358	358	17	355	355	25
	2, 2'	400	400	6	350	350	18
	3, 3'	400	400	7	376	376	6
	4, 4'	400	400	20	370	370	16
	5, 5'	400	400	20	390	390	26
VII	1	400	400	20	390	390	26
	2, 2'	400	400	20	390	390	26
	3, 3'	400	400	20	390	390	26
	4, 4'	400	400	20	390	390	26
	5, 5'	400	400	20	390	390	26

IV. Prozentische Spelzengehalte der einzelnen Körner in den verschiedenen Verzweigungsordnungen.

Beseler Nr. 1 R 1							Beseler Nr. 1 R 2					
Quirl	I	II	III	IV	V	VI	Quirl	I	II	III	IV	V
7	30,1						6	29,2				
6	30,3	31,1					5	28,7	32,6			
5	29,5	29,8					4	30,3	t			
4	30,6	31,1							31,4	35,6		
		34,0	30,4				3	31,7	30,9			
3	31,3	31,7							31,2	34,9		
		30,7	30,0						32,3	31,0		
		31,1	30,6							34,1	33,5	
		0	0	35,7			2	0	30,3			
2	30,2	29,9							31,0	32,8		
		37,7	32,7						30,5	31,3		
		30,6	32,9							34,1	33,2	
			31,8	30,4	32,6					31,4	32,3	
			31,3	0	33,7						37,7	33,5
				0	31,7							36,3
					0	32,6				32,3	32,7	
		29,3	0	30,3						33,2	34,8	
			30,9	32,9			1	33,6	31,4			
				30,2					34,5	31,9		
1	31,7	31,1							35,5	0	34,0	
		30,8	30,9	32,9					33,3	32,4		
		31,2	33,2							34,5	37,1	
			32,8	31,8						0	0	
		32,7	33,3								34,0	
			31,8	0							32,0	35,4
			34,3	34,5								33,7
				34,4					31,8	34,0	0	
				33,1	31,6					36,1	34,3	
					31,9							
			33,9	31,2								
				31,0								
				33,9	32,9							
					34,3							
		32,0	30,4									
			30,1	29,8								
			35,1	30,9								
			32,9	42,7								
				32,3								

N H 3 Nr. 1 R 1						N H 3 Nr. 3						
Quirl	I	II	III	IV	V	Quirl	I	II	III	IV	V	VI
6	35,6					6	31,0					
5	36,7	37,6				5	30,5	30,7	33,5			
4	38,5	36,7				4	31,7	32,9	31,0			
		40,2	48,5					33,0	34,2			
3	36,3	39,9				3	30,2	31,9				
		43,1	38,6	40,1				34,0	33,3			
		39,3	41,3						34,4	31,8		
2	36,1	38,1	39,1					33,2	32,3			
		38,7	39,9	40,0		2	33,0	31,3				
			39,8	40,4				30,2	32,7			
				40,4	37,6			30,4	30,8			
		38,9	41,0						29,7	31,8		
			38,4	40,7	40,6				32,1	30,4		
1	41,6	38,9	39,9							34,8	33,1	
		43,0	0					0	33,0			
		38,3	38,7						30,4	35,1	30,1	
			50,0	51,1		1	29,9	31,6				
			41,3	41,1				35,0	35,9			
				41,2	48,1			32,6	34,2	32,3		
				43,5	40,5				32,7	31,5	39,1	
			41,8	0	43,3					34,2	30,1	32,2
		39,3	0						33,7	34,2	32,3	
			38,7					31,9	34,3			
			40,8	38,4	41,1				37,7	32,9		
									32,8	31,7	30,9	

N H 3 Nr. 4							Leutewiger Nr. 1 R 1					
Quirl	I	II	III	IV	V	VI	Quirl	I	II	III	IV	V
6	31,9	34,0					7	27,9				
5	32,6	33,5	33,7				6	42,5	28,7			
4	0	34,8					5	27,2	26,7			
		34,4	35,1						27,8			
3	34,6	34,1					4	27,3	27,3	28,2		
		0	0						28,1	28,5	0	
			33,9	33,3					28,4	29,4		
		36,9	32,7							28,6	29,4	
2	30,4	35,0					3	26,9	27,1			
		33,4	33,5						27,5	30,8	29,5	
		34,8	33,0						28,4	31,6		
			35,5	32,2	33,5					28,5	30,1	
			33,0	33,3					26,9	28,9	29,6	
				34,4	32,7	35,1				32,7	29,4	
		33,8	37,1	36,7						26,8	28,1	
			34,7	34,4	35,2						29,6	30,0
1	30,6	35,2					2	27,5	26,8			
		35,5							27,3	27,9		
		32,6	35,5	31,7					27,2	27,5		
		33,1	35,1	40,5						30,5	29,9	
			33,1	37,5					27,2	27,8		
				38,6	32,3					0		
				36,3	34,9					28,9	28,7	
					33,1	33,0					32,4	
			36,7	36,4					26,8	28,7		
				35,8	35,5					27,5	29,4	
	42,4	35,2								28,9	29,7	
		33,7	35,0								29,9	29,7
		35,6	33,4							29,9	29,4	29,7
			34,8	40,8							29,7	32,5
							1	27,4	28,2			
									29,2	28,0		
									28,4	31,1		
										30,6	31,8	
									29,4	0		
									28,5	30,1		
										28,9		
										30,8		
									27,9	29,6		
										28,6	0	
										28,4	33,2	
										30,9		
										27,6	30,4	
											28,6	

V. Die mittleren Speisengewichte der einzelnen Ordnungen der Rippe.

Quirl	I	II	III	IV	V	VI	M. Sp. G. in %	Quirl	I	II	III	IV	V	VI	M. Sp. G. in %
Befeler Nr. 1 R 1															
7	30,1					Spitze	28,9	7	28,3					Spitze	29,6
6	30,3	31,1					30,1	6	30,3						28,3
5	29,5	29,8					30,7	5	29,6	28,0					30,3
4	30,6	32,5	30,4				29,6	4	28,3	30,5	28,8				28,8
3	31,3	31,2		35,7			31,2	3	0	29,3	0				29,4
2	30,2	31,9	31,9	30,9	32,7		32,1	2	28,6	28,8	30,1	30,9	30,0		29,9
1	31,7	31,7	32,6	33,2	32,7	32,6	31,7	1	30,0	29,8	30,1	33,6	39,3		30,3
							32,4					32,2			32,3
Befeler Nr. 2 R 2															
7	29,2	32,6				Spitze	30,5	7	29,0					Spitze	28,9
6	28,7	31,4					29,2	6	29,0	0					29,0
5	30,3	31,4	35,6				30,6	5	0	30,1					29,0
4	31,7	33,3	33,5	33,5			32,4	4	0	29,5	0	29,6			30,1
3	0	31,0	32,6	34,5	34,9		32,5	3	30,0	33,2	32,7	30,2			29,5
2	33,6	33,3	33,5	34,7			33,2	2	30,6	31,1	11,3	29,7			31,5
1							33,8	1	29,2	32,7	30,1	30,9			30,7
															30,7
Befeler Nr. 3															
6	0	31,3	31,8			Spitze	31,6	6	32,7	32,6				Spitze	30,4
5	29,9	0					0	5	30,0	30,8	30,5				31,6
4	0	31,9	31,9				29,9	4	0	30,8					31,6
3	32,6	31,6	30,9	32,2			32,1	3	29,9	33,9	31,1	32,5			30,7
2	32,6	31,6	30,9	31,0	35,0	34,4	32,6	2	31,8	30,7	31,9	33,6	32,3		31,8
1	36,1	32,7	32,9	32,9	32,1		33,3	1	0	32,9	34,4	34,0	34,5	32,8	32,1
															33,7

∞

Quirl	I	II	III	IV	V	VI	M. Sp. G. in ‰
-------	---	----	-----	----	---	----	-------------------

N H 3 Str. 1 R 1	35,6	37,6	48,5	40,1	39,1	Epithe	35,1
6	36,7	37,6					35,6
5	38,5	38,4	48,5	40,1			37,1
4	36,3	40,8	39,9	40,4			41,8
3	36,1	38,6	39,6				39,3
2			41,6	42,7			38,7
1					43,9		41,9

Reutenhofer Str. 1 R 1	27,9	28,7	28,7	29,4	30,0	Epithe	26,9
7	42,5	27,2					27,9
6	27,2	27,9	28,7	29,4			35,6
5	27,3	27,5	29,8	30,2	29,7		27,2
4	26,9	27,1	28,6				28,3
3	27,5	28,6					28,7
2	27,4	29,5					28,6
1							29,1

N H 3 Str. 3	31,0	30,7	33,5	31,8	31,6	Epithe	31,0
6	30,5	32,9	32,6				31,5
5	31,7	33,0	33,3	31,8			32,4
4	30,2	30,6	31,5	33,0			31,9
3	33,0		32,8	33,1			32,5
2	29,9						
1							

Rigomo Str. 1	26,9	29,1	29,0	27,2	28,3	Epithe	29,9
7	30,7	29,7					26,9
6	28,9	29,1	28,0	27,2	26,7		30,7
5	28,5	27,3	27,0	26,1	27,5		29,0
4	27,5	27,5					28,7
3	30,9	27,6					27,3
2							27,9
1							27,2

N H 3 Str. 4	31,9	34,0	33,7	33,3	33,8	Epithe	32,8
6	32,6	33,5	35,1	34,2			32,9
5	0	34,6	33,3	34,5	35,1		33,8
4		35,5	34,5	35,7	33,0		34,2
3	34,6	34,2	34,9				33,7
2	30,4						34,3
1	30,6						

Saulöfs Gölbreger	29,8	33,1	29,5	30,6	30,1	Epithe	44,7
7	27,1	28,7					29,8
6	28,4	29,5	30,6	30,2			30,1
5	29,0	28,9	30,2				28,8
4	28,6	30,6	30,5				29,4
3	30,6	31,0					29,6
2	29,4						30,0
1							30,3

